

ヘパリン類似物質 クリーム／油性クリーム「日医工」 を使用されている方へ

- このおくすりは皮膚の保湿作用があり、皮膚の乾燥性症状を軽くします。また、使用部位の血行を促進し、血行障害に基づく痛みや腫れを軽くします。
- 医師の指示に従い1日に1～数回（朝、昼、夕方、お風呂上がり、寝る前など）適量を患部に塗布してください。
- 大人の人差し指の先から第1関節まで押出した量（約0.5g）は大人の手のひら2つ分の面積に塗布できます（右図）。



ご使用前に

次の方は必ず医師にご相談ください。

- 出血しやすい方
- 過去に医師から出血に注意するよう指導を受けたことがある方

ご使用後に

次のような症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。

- 皮膚の刺激感、かゆみ
- 湿疹、かぶれ
- 皮膚の赤らみ
- 紫色の皮下出血




患者さまへ

ご使用に際しての注意



- 傷口や皮膚のただれているところ（潰瘍やびらん面）には塗らないでください。
- 目の中には使用しないでください。目の周辺に使用する場合は、目の中に入らないように注意してください。万一、目の中に入った場合には、直ちにきれいな水で洗い流し、違和感があれば医師にご相談ください。
- このおくすりを口に入れないでください。
- 使用した後は、しっかりキャップをしめ、なるべく涼しいところに保管してください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。



ヘパリン類似物質 クリーム／油性クリーム「日医工」 を使用されている方へ

- このおくすりは皮膚の保湿作用があり、皮膚の乾燥性症状を軽くします。また、使用部位の血行を促進し、血行障害に基づく痛みや腫れを軽くします。
- 医師の指示に従い1日に1～数回（朝、昼、夕方、お風呂上がり、寝る前など）適量を患部に塗布してください。
- 大人の人差し指の先から第1関節まで押出した量（約0.5g）は大人の手のひら2つ分の面積に塗布できます（右図）。



ご使用前に

次の方は必ず医師にご相談ください。

- 出血しやすい方
- 過去に医師から出血に注意するよう指導を受けたことがある方

ご使用後に

次のような症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。

- 皮膚の刺激感、かゆみ
- 湿疹、かぶれ
- 皮膚の赤らみ
- 紫色の皮下出血



患者さまへ

ご使用に際しての注意



- 傷口や皮膚のただれているところ（潰瘍やびらん面）には塗らないでください。
- 目の中には使用しないでください。目の周辺に使用する場合は、目の中に入らないように注意してください。万一、目の中に入った場合には、直ちにきれいな水で洗い流し、違和感があれば医師にご相談ください。
- このおくすりを口に入れないでください。
- 使用した後は、しっかりキャップをしめ、なるべく涼しいところに保管してください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。



注意!!
目に入らないように

