


ヘパリン類似物質 ローション0.3%「日医工」 を使用されている方へ

●このおくすりは皮膚の保湿作用があり、皮膚の乾燥性症状を軽くします。また、使用部位の血行を促進し、血行障害に基づく痛みや腫れを軽くします。

●医師の指示に従い1日に1～数回(朝、昼、夕方、お風呂上がり、寝る前など)適量を患部に塗布してください。

●2～3回振り出した量(1円硬貨大:約0.5g)は大人の手のひら2つ分の面積に塗布できます。



ご使用前に

次の方は必ず医師にご相談ください。

- 出血しやすい方
- 過去に医師から出血に注意するよう指導を受けたことがある方

ご使用後に

次のような症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。

- 皮膚の刺激感、かゆみ
- 湿疹、かぶれ
- 皮膚の赤らみ
- 紫色の皮下出血



(工場用コード)




ヘパリン類似物質 ローション0.3%「日医工」 を使用されている方へ

●このおくすりは皮膚の保湿作用があり、皮膚の乾燥性症状を軽くします。また、使用部位の血行を促進し、血行障害に基づく痛みや腫れを軽くします。

●医師の指示に従い1日に1～数回(朝、昼、夕方、お風呂上がり、寝る前など)適量を患部に塗布してください。

●2～3回振り出した量(1円硬貨大:約0.5g)は大人の手のひら2つ分の面積に塗布できます。



ご使用前に

次の方は必ず医師にご相談ください。

- 出血しやすい方
- 過去に医師から出血に注意するよう指導を受けたことがある方

ご使用後に

次のような症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。

- 皮膚の刺激感、かゆみ
- 湿疹、かぶれ
- 皮膚の赤らみ
- 紫色の皮下出血



(工場用コード)



患者さまへ


ご使用に際しての注意

●耳や鼻の中に入らないように注意してください。また、傷口や皮膚のただれているところ(潰瘍やびらん面)には塗らないでください。

●目の中には使用しないでください。目の周辺に使用する場合は、目の中に入らないように注意してください。万一、目の中に入った場合には、直ちにきれいな水で洗い流し、違和感があれば医師にご相談ください。

●使用した後は、しっかりキャップをしめ、なるべく涼しいところに保管してください。

●お子様の手の届かないところに保管してください。



目や鼻に入らないように!!



日医工 株式会社
NICHIKO

0001704-1

2020年12月作成 N202000287

患者さまへ


ご使用に際しての注意

●耳や鼻の中に入らないように注意してください。また、傷口や皮膚のただれているところ(潰瘍やびらん面)には塗らないでください。

●目の中には使用しないでください。目の周辺に使用する場合は、目の中に入らないように注意してください。万一、目の中に入った場合には、直ちにきれいな水で洗い流し、違和感があれば医師にご相談ください。

●使用した後は、しっかりキャップをしめ、なるべく涼しいところに保管してください。

●お子様の手の届かないところに保管してください。



目や鼻に入らないように!!



日医工 株式会社
NICHIKO

0001704-1


2020年12月作成 N202000287

ヘパリン類似物質 ローション0.3%「日医工」 を使用されている方へ

●このおくすりは皮膚の保湿作用があり、皮膚の乾燥性症状を軽くします。また、使用部位の血行を促進し、血行障害に基づく痛みや腫れを軽くします。

●医師の指示に従い1日に1～数回(朝、昼、夕方、お風呂上がり、寝る前など)適量を患部に塗布してください。

●2～3回振り出した量(1円硬貨大:約0.5g)は大人の手のひら2つ分の面積に塗布できます。



ご使用前に

次の方は必ず医師にご相談ください。

- 出血しやすい方
- 過去に医師から出血に注意するよう指導を受けたことがある方

ご使用後に

次のような症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。

- 皮膚の刺激感、かゆみ
- 湿疹、かぶれ
- 皮膚の赤らみ
- 紫色の皮下出血



(工場用コード)




ヘパリン類似物質 ローション0.3%「日医工」 を使用されている方へ

●このおくすりは皮膚の保湿作用があり、皮膚の乾燥性症状を軽くします。また、使用部位の血行を促進し、血行障害に基づく痛みや腫れを軽くします。

●医師の指示に従い1日に1～数回(朝、昼、夕方、お風呂上がり、寝る前など)適量を患部に塗布してください。

●2～3回振り出した量(1円硬貨大:約0.5g)は大人の手のひら2つ分の面積に塗布できます。



ご使用前に

次の方は必ず医師にご相談ください。

- 出血しやすい方
- 過去に医師から出血に注意するよう指導を受けたことがある方

ご使用後に

次のような症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。

- 皮膚の刺激感、かゆみ
- 湿疹、かぶれ
- 皮膚の赤らみ
- 紫色の皮下出血



(工場用コード)



患者さまへ


ご使用に際しての注意

●耳や鼻の中に入らないように注意してください。また、傷口や皮膚のただれているところ(潰瘍やびらん面)には塗らないでください。

●目の中には使用しないでください。目の周辺に使用する場合は、目の中に入らないように注意してください。万一、目の中に入った場合には、直ちにきれいな水で洗い流し、違和感があれば医師にご相談ください。

●使用した後は、しっかりキャップをしめ、なるべく涼しいところに保管してください。

●お子様の手の届かないところに保管してください。



目や鼻に入らないように!!



日医工 株式会社
NICHIKO

0001704-1

2020年12月作成 N202000287

患者さまへ


ご使用に際しての注意

●耳や鼻の中に入らないように注意してください。また、傷口や皮膚のただれているところ(潰瘍やびらん面)には塗らないでください。

●目の中には使用しないでください。目の周辺に使用する場合は、目の中に入らないように注意してください。万一、目の中に入った場合には、直ちにきれいな水で洗い流し、違和感があれば医師にご相談ください。

●使用した後は、しっかりキャップをしめ、なるべく涼しいところに保管してください。

●お子様の手の届かないところに保管してください。



目や鼻に入らないように!!



日医工 株式会社
NICHIKO

0001704-1

2020年12月作成 N202000287