


ドネペジル塩酸塩内服ゼリー「日医工」 を服用される方、ご家族・介護者の方へ

このお薬は、アルツハイマー型認知症およびレビー小体型認知症の認知症症状の進行を遅らせるお薬です。

▶ 飲み方について


- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。自己判断で服用を中止したり、お薬の量を減らしたりすると、病気が悪化することがあります。
- 飲み忘れに気付いても、決して2回分を一度に服用しないでください。
- このお薬は、水なしで服用できるウメ風味のゼリー剤です。スティック包装の中に、ゼリーと空気が入っています。空気部分を押し出すことでゼリーがスムーズに出てきます。



オモテ、ウラ、どちらの向きからも開封することができます。



開封する時は、必ず切り口のある方を上にして持ちます。



切り口の切れ目から端まで切り取ってください。



膨らんでいる空気部分を押し出すとゼリーが出てきます。注 出てきたゼリーを服用してください。

注：空気部分を強く一気に押し出すと中のゼリーが飛び出すことがあります。

服薬スケジュール 1日1回服用してください。

	1週間	2週間	3週間	4週間以上経過後
アルツハイマー型認知症の場合	3mg 	3mg または 5mg	5mg 	5mg
アルツハイマー型認知症で症状が進行した場合 レビー小体型認知症の場合	3mg 	3mg または 5mg	5mg 	10mg

※症状によってお薬の量が変わることがあります。

▶服用中の注意点

- このお薬を服用すると、気を失う等の意識障害、めまい、眠気などがあらわれることがあります。**自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。**
- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局で他のお薬を購入する場合には、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

▶副作用について

- 次の症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

食欲不振

吐き気


下痢

腹痛

- この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

▶保管等に関する注意点

- お薬はできるだけご家族や介護者の方が管理するようにしてください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 光のあたらない涼しいところに保管してください。(ゼリーが凍らないように注意)
- アルミ袋のまま保管してください。
- アルミ袋開封後は 1ヶ月以内に服用してください。
- スティック包装の中のゼリーを、他の容器に移しかえて保管しないでください。
- 上に重いものを乗せたり、折り曲げたりしないでください。



患者さま用保管袋



※アルミ袋に7包入っています。



日医工株式会社

NICHIKO

2023年6月作成 N202300064