

# 患者様向け使用説明書変更のご案内 ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」

医療関係者 各位

謹 啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さてこの度、弊社販売の『ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」』につきまして、患者様向け使用説明書を変更致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹 白

記

## 1. 変更内容

### ■患者様向け使用説明書

・デザインおよび文言を変更(赤下線部分)・追記(赤枠口部分)し、日医工株式会社\*のロゴを追記しました。(下記の図をご参照ください。)

※:【修正箇所】上記説明に誤記がございました。訂正してお詫びいたします。

(誤)株式会社⇒(正)日医工株式会社

\* 図(原寸大ではありません。上:表面、下:裏面)

変更前

患者さまへ

**血行促進・皮膚保湿剤**  
**ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%の使い方**

●このおくすりは  
皮膚の水分を保持し  
潤いを保ちます。



●初めて使用する際は、真つすぐ立てて4~5回空噴霧した後、使用してください。

●使用した後は噴霧口を拭き取り、付属のキャップをして、なるべく涼しいところで保管してください。

●噴霧できなくなる恐れがありますので、針のようなもので突くなどして噴霧口にキズをつけないでください。

**このスプレー容器は  
逆さにしても  
噴霧できます!**




(江増用コード)

変更後

**ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」<sup>®</sup>**  
**使用されている方へ**

●このおくすりは  
皮膚の水分を保持し  
潤いを保ちます。

●**4回の噴霧量  
(約0.5g)は大人の  
手のひら2つつ分です。**



**ご使用に際しての注意**

●耳や鼻の中に入らないように注意してください。また、傷口や皮膚のただれているところ(潰瘍やびらん面)には噴霧しないでください。


●皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。

●目の中や目の周辺には噴霧しないでください。万一、目の中に入った場合には、直ちにきれいな水で洗い流し、**違和感があれば医師にご相談ください。**

●吸入する可能性があるので、顔面や頭部等には注意して噴霧してください。

●初めて使用する際は、真つすぐ立てて4~5回空噴霧した後、使用してください。

●使用した後は噴霧口を拭き取り、付属のキャップをして、なるべく涼しいところで保管してください。



(江増用コード)

File No.20161227b16

**変更前**

**患者さまへ**

- 医師の指示に従い1日に1～数回（朝、昼、夕方、お風呂上がり、寝る前など）適量を患部に噴霧してください。
- 患部から約10cm離して大人の手のひら2つ分に4回噴霧（約0.5g）すれば適量です。



**ご使用に際しての注意**

- 耳や鼻の中に入らないように注意してください。また、傷口や皮膚がただれているところ（潰瘍やびらん面）には噴霧しないでください。
- 皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
- 目の中や目の周辺には噴霧しないでください。万一、目の中に入った場合は、直ちにきれいな水で洗い流し、医師または薬剤師にご相談されることをお勧めします。
- 吸入する可能性があるため、顔面や頭部等には注意して噴霧してください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。



版番号 10-06S 2015年4月作成 N201500071

**変更後**

**患者さまへ**

- 医師の指示に従い1日に1～数回（朝、昼、夕方、お風呂上がり、寝る前など）適量を患部に噴霧してください。
- 患部から約10cm離して噴霧してください。



このスプレー容器は逆さにしても噴霧できます！

**おくすりの塗り方の目安 入浴後5分以内が効果的**

- かゆみは皮膚の乾燥とともに出てきます。お風呂上がりやシャワーの後に水滴を拭き取り、5分以内に噴霧すると効果的です。

「外用薬の正しい使い方（九州大学大学院 皮膚科学 古江博隆教授 監修）」より一部転載

- 噴霧できなくなる恐れがありますので、針のようなもので突くなどして噴霧口にキズをつけないでください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。



**日医工株式会社**

3002116-2 P.16年4月作成 N201500215

**2. 変更品開始ロットおよび出荷時期**

| 包装規格     | 統一商品コード     | 調剤包装単位コード      | 販売包装単位コード      | 変更ロット   | 使用期限     | 出荷開始時期    |
|----------|-------------|----------------|----------------|---------|----------|-----------|
| 100g×10本 | 376-59361-8 | 04987376593694 | 14987376593615 | JG1100Y | 2019年10月 | 2017年2月中旬 |

・流通在庫の関係から予定時期が前後することがありますが、何卒ご了承ください。

以上