


ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 の使い方について

使用方法


- 押し出しボタンを押して噴霧してください。
押したボタンが元に戻ってから、次の噴霧を行ってください。（連射しないでください。）



注意事項

- 押したボタンが元に戻らないうちに繰り返し押すと液が直線状に出たり、液だれの状態になることがあります。

このような場合は、一度倒立状態（逆さ）にして1～2回噴霧してから、再度噴霧してください。



- 液が残り少ない状態で斜めに使用すると噴霧できなくなることがあります。

このような場合は、一度倒立状態（逆さ）にして1～2回噴霧してから、再度噴霧してください。




- 冷蔵庫に保管後すぐに使用したり、寒い時期に使用した場合、正しく使用しても霧状に噴霧できないことがあります。これは低温になることにより液の粘性が高くなり、霧状になりにくくなるためです。このような場合は、手で温めるなどしてから使用してください。



ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 の使い方について

使用方法


- 押し出しボタンを押して噴霧してください。
押したボタンが元に戻ってから、次の噴霧を行ってください。（連射しないでください。）



注意事項

- 押したボタンが元に戻らないうちに繰り返し押すと液が直線状に出たり、液だれの状態になることがあります。

このような場合は、一度倒立状態（逆さ）にして1～2回噴霧してから、再度噴霧してください。



- 液が残り少ない状態で斜めに使用すると噴霧できなくなることがあります。

このような場合は、一度倒立状態（逆さ）にして1～2回噴霧してから、再度噴霧してください。



- 冷蔵庫に保管後すぐに使用したり、寒い時期に使用した場合、正しく使用しても霧状に噴霧できないことがあります。これは低温になることにより液の粘性が高くなり、霧状になりにくくなるためです。このような場合は、手で温めるなどしてから使用してください。

