

ヘパリン類似物質 外用スプレー0.3%「日医工」 を使用されている方へ

- このおくすりは皮膚の保湿作用があり、皮膚の乾燥性症状を軽くします。また、使用部位の血行を促進し、血行障害に基づく痛みや腫れを軽くします。
- 医師の指示に従い1日に1～数回（朝、昼、夕方、お風呂上がり、寝る前など）適量を患部に噴霧してください。
- 4回のプッシュで大人の手のひら2つ分の面積に噴霧できます。



ご使用前に

次の方は必ず医師にご相談ください。

- 出血しやすい方
- 過去に医師から出血に注意するよう指導を受けたことがある方

ご使用後に

次のような症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。

- 皮膚の刺激感、かゆみ
- 湿疹、かぶれ
- 皮膚の赤らみ
- 紫色の皮下出血



患者さまへ


ご使用に際しての注意



- 初めて使用する際は、真っすぐ立てて4～5回空噴霧した後、使用してください。
- 患部から約10cm離して噴霧してください。
- 使用した後は噴霧口をふき取り、付属のキャップをして、なるべく涼しいところに保管してください。
- 噴霧できなくなる恐れがありますので、針のようなもので突くなどして噴霧口にキズをつけないでください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 耳や鼻の中に入らないように注意してください。また、傷口や皮膚のただれているところ（潰瘍やびらん面）には噴霧しないでください。
- 目の中には使用しないでください。目の周辺に使用する場合は、目の中に入らないように注意してください。万一、目の中に入った場合には、直ちにきれいな水で洗い流し、違和感があれば医師にご相談ください。
- 吸入する可能性があるため、顔面や頭部等には注意して使用してください。



このスプレー容器は
逆さにしても
噴霧できます！



 日医工 株式会社
NICH-I-KO

ヘパリン類似物質 外用スプレー0.3%「日医工」 を使用されている方へ

- このおくすりは皮膚の保湿作用があり、皮膚の乾燥性症状を軽くします。また、使用部位の血行を促進し、血行障害に基づく痛みや腫れを軽くします。
- 医師の指示に従い1日に1～数回（朝、昼、夕方、お風呂上がり、寝る前など）適量を患部に噴霧してください。
- 4回のプッシュで大人の手のひら2つ分の面積に噴霧できます。



ご使用前に

次の方は必ず医師にご相談ください。

- 出血しやすい方
- 過去に医師から出血に注意するよう指導を受けたことがある方

ご使用後に

次のような症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。

- 皮膚の刺激感、かゆみ
- 湿疹、かぶれ
- 皮膚の赤らみ
- 紫色の皮下出血



患者さまへ


ご使用に際しての注意



- 初めて使用する際は、真っすぐ立てて4～5回空噴霧した後、使用してください。
- 患部から約10cm離して噴霧してください。
- 使用した後は噴霧口をふき取り、付属のキャップをして、なるべく涼しいところに保管してください。
- 噴霧できなくなる恐れがありますので、針のようなもので突くなどして噴霧口にキズをつけないでください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 耳や鼻の中に入らないように注意してください。また、傷口や皮膚のただれているところ（潰瘍やびらん面）には噴霧しないでください。
- 目の中には使用しないでください。目の周辺に使用する場合は、目の中に入らないように注意してください。万一、目の中に入った場合には、直ちにきれいな水で洗い流し、違和感があれば医師にご相談ください。
- 吸入する可能性があるため、顔面や頭部等には注意して使用してください。



このスプレー容器は
逆さにしても
噴霧できます！



 日医工 株式会社
NICH-I-KO