

\*\*2012年6月改訂(第5版)  
\*2009年6月改訂

貯 法 保存条件 室温保存  
容 器 気密容器  
使用期限 ラベルに記載

**【禁忌(次の部位には使用しないこと)】**

重度又は広範囲の熱傷[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある。]

**【組成・性状】**

**\*\*1. 組 成**

本品は定量するとき、酸化亜鉛(ZnO: 81.38) 18.5~21.5%を含む。

1g中 日本薬局方 酸化亜鉛 200mg  
添加物 流動パラフィン、サラシミツロウ、白色ワセリン、  
ソルビタンセスキオレイン酸エステル

**2. 製剤の性状**

本品は白色である。

**【効能・効果】**

下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐

外傷、熱傷、凍傷、湿疹・皮膚炎、肛門癢痒症、白癬、面皰、癩、  
その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面

**【用法・用量】**

通常、症状に応じ1日1~数回、患部に塗擦又は貼布する。

**【使用上の注意】**

**1. 副作用**

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 <sup>注)</sup>	過敏症状
皮膚 <sup>注)</sup>	発疹、刺激感等

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

日本薬局方

亜鉛華軟膏

\*\*〈亜鉛華軟膏「日医工」〉

ZINC OXIDE OINTMENT

500g

製造番号

使用期限

\*\* 製造販売元  
日医工株式会社  
NICHIKO 富山市総曲輪1丁目6番21

日本標準商品分類番号  
872649

承認番号 16100AMZ 00057000  
\*\*薬価収載 2012年6月  
販売開始 2006年1月  
再評価結果 1979年2月

**2. 適用上の注意**

眼には使用しないこと。

**【有効成分に関する理化学的知見】**

一般名: 酸化亜鉛(Zinc Oxide)

分子式: ZnO

\*\*分子量: 81.38

**【包 装】**

500g

**\*【問い合わせ先】**

日医工株式会社 お客様サポートセンター  
〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21  
☎(0120)517-215 Fax (076)442-8948

〈調剤包装単位用〉



(01)04987376594493

〈販売包装単位用〉



(01)14987376594414



ボトル  
キャップ  
シュリンク