

使用上の注意改訂のお知らせ

抗血小板剤

アスピリン腸溶錠 100mg「日医工」

アスピリン腸溶錠

解熱鎮痛消炎剤

日本薬局方

アスピリン

<アスピリン「日医工」>

製造販売元 日医工株式会社

富山市総曲輪1丁目6番21

この度、上記製品につきまして「使用上の注意」の一部を改訂（下線部分）いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<アスピリン腸溶錠 100mg「日医工」 改訂内容>（ ：自主改訂）

| 改訂後 | | | 現行 | | |
|--|---------------------------|---|--|---------------------------|---|
| 3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること） | | | 3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること） | | |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 | 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| （現行どおり） | | | （略） | | |
| イブプロフェン ナプロキセン <u>ピロキシカム</u> | 本剤の血小板凝集抑制作用を減弱するとの報告がある。 | 血小板のシクロオキシゲナーゼ-1（COX-1）と本剤の結合を阻害するためと考えられる。 | イブプロフェン ナプロキセン | 本剤の血小板凝集抑制作用を減弱するとの報告がある。 | 血小板のシクロオキシゲナーゼ-1（COX-1）と本剤の結合を阻害するためと考えられる。 |
| （現行どおり） | | | （略） | | |

<アスピリン「日医工」 改訂内容> (_____ : 自主改訂)

| 改 訂 後 | | | | 現 行 | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------|
| 3. 相互作用 | | | | 3. 相互作用 | | | |
| 併用注意（併用に注意すること） | | | | 併用注意（併用に注意すること） | | | |
| 薬剤名等 | | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 | 薬剤名等 | | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| (現行どおり) | | | | (略) | | | |
| 非 ス テ ロ イ ド 系 解 熱 鎮 痛 消 炎 剤 | インドメタシン ジクロフェナ クナトリウム 等 | (現行どおり) | (現行どおり) | インドメタシ ン ジクロフェナ クナトリウム 等 | (略) | (略) | (略) |
| | オキシカム系 消炎鎮痛剤 ピロキシカ ム等 | (現行どおり) | (現行どおり) | オキシカム系 消炎鎮痛剤 ピロキシカ ム等 | (略) | (略) | (略) |
| | スリダク | (現行どおり) | (現行どおり) | スリダク | (略) | (略) | (略) |
| | イブプロフェ ン ナプロキセン <u>ピロキシカム</u> | 本剤の血小板 凝集抑制作用 を減弱すると の報告がある。 | 血小板のシクロ オキシゲナーゼ -1 (COX-1) と本剤の結合を 阻害するためと 考えられる。 | イブプロフェ ン ナプロキセン | 本剤の血小板 凝集抑制作用 を減弱すると の報告がある。 | 血小板のシクロ オキシゲナーゼ -1 (COX-1) と本剤の結合を 阻害するためと 考えられる。 | (略) |
| (現行どおり) | | | | (略) | | | |

*改訂内容につきましては DSU No.260 に掲載の予定です。

<改訂理由>

- ・ ピロキシカム製剤（商品名：バキソ）において、「アスピリン」が「併用注意」とされていることから、整合をとるため、本剤においても「ピロキシカム」を「相互作用」の「併用注意」といたしました。

なお、改訂後の添付文書は日医工株式会社ホームページ

http://www.nichiiko.co.jp/medicine/medicine_m_seihin.html

及び医薬品医療機器情報提供ホームページ <http://www.pmda.go.jp/> に掲載いたします。