


日医工の メマンチン塩酸塩OD錠

を服用される方とご家族・介護者の方へ

このお薬は、
アルツハイマー型認知症の症状の進行を遅らせるお薬です。

▶ 飲み方について

- このお薬を飲み始めるときは、体をお薬に慣らすために、下記のように少量から服用を開始し、徐々に増やしていきます。お薬の量を増やすのは、症状が悪化したからではありません。



- 症状に変化がないように見えても、自己判断で服用をやめたりお薬の量を加減したりしないで、主治医または薬剤師の指示通りに、決められた量の服用を続けてください。
- このお薬は食事の時間にかかわらず服用できます。時間を決めて、毎日1回規則正しく服用してください。
- 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。
- このお薬は水なしでも服用することができます。舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。ただし、水なしの場合には寝たままで服用しないでください。

▶ 服用中の注意点

- 飲み始めに、めまいや眠気があらわれることがありますので、転倒などに注意してください。
- このお薬の服用中に気になる症状があらわれた場合や、わからないことがある場合には、主治医または薬剤師に気軽に相談してください。
- アルツハイマー型認知症では、自動車の運転などの機械操作能力が低下することがあります。また、このお薬によって、めまいや眠気などがあらわれることがありますので、**自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。**



- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

▶ 保管等に関する注意点

- お薬は、できるだけご家族や介護者の方が管理するようにしてください。
- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。




日医工の メマンチン塩酸塩OD錠

を服用される方とご家族・介護者の方へ

このお薬は、
アルツハイマー型認知症の症状の進行を遅らせるお薬です。

▶ 飲み方について

- このお薬を飲み始めるときは、体をお薬に慣らすために、下記のように少量から服用を開始し、徐々に増やしていきます。お薬の量を増やすのは、症状が悪化したからではありません。



- 症状に変化がないように見えても、自己判断で服用をやめたりお薬の量を加減したりしないで、主治医または薬剤師の指示通りに、決められた量の服用を続けてください。
- このお薬は食事の時間にかかわらず服用できます。時間を決めて、毎日1回規則正しく服用してください。
- 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。
- このお薬は水なしでも服用することができます。舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。ただし、水なしの場合には寝たままで服用しないでください。

▶ 服用中の注意点

- 飲み始めに、めまいや眠気があらわれることがありますので、転倒などに注意してください。
- このお薬の服用中に気になる症状があらわれた場合や、わからないことがある場合には、主治医または薬剤師に気軽に相談してください。
- アルツハイマー型認知症では、自動車の運転などの機械操作能力が低下することがあります。また、このお薬によって、めまいや眠気などがあらわれることがありますので、**自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。**



- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

▶ 保管等に関する注意点

- お薬は、できるだけご家族や介護者の方が管理するようにしてください。
- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。

