

エルトロンバグ錠「日医工」を服用される 免疫性血小板減少症 の患者さんへ


飲み方について

●1日1回

食事の前後2時間を避けて空腹時に服用します。食事と一緒に服用するとお薬の作用を弱めることがあります。

- 牛乳などの乳製品、ミネラル(鉄、カルシウム、アルミニウム、マグネシウム、セレン、亜鉛など)を含むサプリメントと一緒に服用するとお薬の作用を弱めることがあります。これらの摂取は、お薬の服用4時間前から服用2時間後までは避けてください。

お薬の作用を弱める食品・サプリメント 例




牛乳、クリーム、バター、チーズ、ヨーグルト
アイスクリーム類、乳製品、ミネラルを含むサブリ など


毎日、なるべく
同じ時刻に服用

← 乳製品、ミネラル(鉄、カルシウム、アルミニウム、マグネシウム、セレン、亜鉛など)を含むサプリメントを取らない
→ 食事を取らない

例1



例2



日医工株式会社

2026年9月作成 N202600157

エルトロンバグ錠「日医工」を服用される 免疫性血小板減少症 の患者さんへ

飲み方について

●1日1回

食事の前後2時間を避けて空腹時に服用します。食事と一緒に服用するとお薬の作用を弱めることがあります。

- 牛乳などの乳製品、ミネラル(鉄、カルシウム、アルミニウム、マグネシウム、セレン、亜鉛など)を含むサプリメントと一緒に服用するとお薬の作用を弱めることがあります。これらの摂取は、お薬の服用4時間前から服用2時間後までは避けてください。

お薬の作用を弱める食品・サプリメント 例




牛乳、クリーム、バター、チーズ、ヨーグルト
アイスクリーム類、乳製品、ミネラルを含むサブリ など


毎日、なるべく
同じ時刻に服用

← 乳製品、ミネラル(鉄、カルシウム、アルミニウム、マグネシウム、セレン、亜鉛など)を含むサプリメントを取らない
→ 食事を取らない

例1



例2



日医工株式会社

2026年9月作成 N202600157

エルトロンバグ錠「日医工」を服用される 免疫性血小板減少症 の患者さんへ

飲み方について

●1日1回

食事の前後2時間を避けて空腹時に服用します。食事と一緒に服用するとお薬の作用を弱めることがあります。

- 牛乳などの乳製品、ミネラル(鉄、カルシウム、アルミニウム、マグネシウム、セレン、亜鉛など)を含むサプリメントと一緒に服用するとお薬の作用を弱めることがあります。これらの摂取は、お薬の服用4時間前から服用2時間後までは避けてください。

お薬の作用を弱める食品・サプリメント 例




牛乳、クリーム、バター、チーズ、ヨーグルト
アイスクリーム類、乳製品、ミネラルを含むサブリ など


毎日、なるべく
同じ時刻に服用

- ← 乳製品、ミネラル(鉄、カルシウム、アルミニウム、マグネシウム、セレン、亜鉛など)を含むサプリメントを取らない
- 食事を取らない

例1



例2



日医工株式会社

2026年9月作成 N202600157

エルトロンバグ錠「日医工」を服用される 免疫性血小板減少症 の患者さんへ

飲み方について

●1日1回

食事の前後2時間を避けて空腹時に服用します。食事と一緒に服用するとお薬の作用を弱めることがあります。

- 牛乳などの乳製品、ミネラル(鉄、カルシウム、アルミニウム、マグネシウム、セレン、亜鉛など)を含むサプリメントと一緒に服用するとお薬の作用を弱めることがあります。これらの摂取は、お薬の服用4時間前から服用2時間後までは避けてください。

お薬の作用を弱める食品・サプリメント 例




牛乳、クリーム、バター、チーズ、ヨーグルト
アイスクリーム類、乳製品、ミネラルを含むサブリ など


毎日、なるべく
同じ時刻に服用

- ← 乳製品、ミネラル(鉄、カルシウム、アルミニウム、マグネシウム、セレン、亜鉛など)を含むサプリメントを取らない
- 食事を取らない

例1



例2



日医工株式会社

2026年9月作成 N202600157