

球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 を服用される方とご家族の方へ

このお薬は、腎臓が悪くなるのを遅らせる働きをする**活性炭**のお薬です。

服用する前に必ずお読みください

他のお薬と同時に飲まないようにしてください。

他に処方されたお薬がある場合は、そのお薬を飲んで**30分～1時間**経過してから、このお薬を飲んでください。

※同時に飲むと、他のお薬の効果を弱めてしまうおそれがあります。

飲み方について

最初、口の中を少量の水で湿らせておき、お薬を口の中へ移します。その後、一気に水で飲むようにしてください。

- 気管に入らないように注意してください。
- 入れ歯、歯の治療中の方は、隙間に入らないよう注意してください。

服用中の注意点

- 飲みにくい時
 - 吐き気や便秘・下痢、腹痛等の消化器症状が強い時
 - その他、何か気づいた点があった時や、わからないことがあった時
- このような時は、早めに主治医または薬剤師に連絡してください。

取扱いに関する注意点

このお薬は小さく硬い黒色の細粒です。机の上や床などにこぼれた際に、こすれて傷つけたりするおそれがありますので、濡れタオル等で拭き取るか掃除機で吸い取ってください。皮膚等に触れても、害はありません。

裏面もお読みください▶

保管等に関する注意点

室温（1～30℃）で保管してください。

このお薬は、肉眼では見えませんが粒に無数の細かな穴が空いています。周りの温度変化により、この穴の中に空気が出たり入ったりします。温度が上がるとスティック包装が膨らみ、温度が下がるとスティック包装がしぼむことがあります。



お薬のスティック包装が膨らんでいる場合がありますが、活性炭の性質によるもので、お薬の有効性および安全性には全く問題はありません。

飲み方の工夫

このお薬を薬局・薬店で販売されている「袋オブラート」に移して飲むと上手に服用することができます。

「袋オブラート」を使った球形吸着炭細粒の飲み方

1 球形吸着炭細粒



お薬を開封し袋オブラートに移します。

2



オブラートの上部をねじって細長くして飲みやすくします。

3



ねじった袋オブラートをコップの水にぬれる程度浸し、そのあと少量の水とともに服用します。

球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 を服用される方とご家族の方へ

このお薬は、腎臓が悪くなるのを遅らせる働きをする**活性炭**のお薬です。

服用する前に必ずお読みください

他のお薬と同時に飲まないようにしてください。

他に処方されたお薬がある場合は、そのお薬を飲んで**30分～1時間**経過してから、このお薬を飲んでください。

※同時に飲むと、他のお薬の効果を弱めてしまうおそれがあります。

飲み方について

最初、口の中を少量の水で湿らせておき、お薬を口の中へ移します。その後、一気に水で飲むようにしてください。

- 気管に入らないように注意してください。
- 入れ歯、歯の治療中の方は、隙間に入らないよう注意してください。

服用中の注意点

- 飲みにくい時
 - 吐き気や便秘・下痢、腹痛等の消化器症状が強い時
 - その他、何か気づいた点があった時や、わからないことがあった時
- このような時は、早めに主治医または薬剤師に連絡してください。

取扱いに関する注意点

このお薬は小さく硬い黒色の細粒です。机の上や床などにこぼれた際に、こすれて傷つけたりするおそれがありますので、濡れタオル等で拭き取るか掃除機で吸い取ってください。皮膚等に触れても、害はありません。

裏面もお読みください▶

保管等に関する注意点

室温（1～30℃）で保管してください。

このお薬は、肉眼では見えませんが粒に無数の細かな穴が空いています。周りの温度変化により、この穴の中に空気が出たり入ったりします。温度が上がるとスティック包装が膨らみ、温度が下がるとスティック包装がしぼむことがあります。



お薬のスティック包装が膨らんでいる場合がありますが、活性炭の性質によるもので、お薬の有効性および安全性には全く問題はありません。

飲み方の工夫

このお薬を薬局・薬店で販売されている「袋オブラート」に移して飲むと上手に服用することができます。

「袋オブラート」を使った球形吸着炭細粒の飲み方

1 球形吸着炭細粒



お薬を開封し袋オブラートに移します。

2



オブラートの上部をねじって細長くして飲みやすくします。

3



ねじった袋オブラートをコップの水にぬれる程度浸し、そのあと少量の水とともに服用します。