

ピロリ菌の除菌治療 を受ける方へ

ピロリ菌の除菌治療では、胃酸を抑えるお薬と2種類の抗菌剤を服用します。ピロリ菌を除菌すると、胃潰瘍・十二指腸潰瘍などピロリ菌が関連する病気の治療や予防が期待できます。

▶ 除菌治療を始める前の注意点

次の方は事前に医師または薬剤師に相談してください。

- これまでにお薬を飲んでアレルギー症状を起こしたことがある方
- 他に服用中のお薬（一般用医薬品を含む）やサプリメントがある方

▶ 除菌治療中の注意点

- 3種類のお薬を**1日2回、7日間**、医師または薬剤師に指示されたスケジュールどおりに服用してください。
- 自分の判断でお薬を減らしたり、服用を中止したりしないでください。
- 2回目の除菌治療を受ける方は、治療中はアルコールの摂取をしないでください。
- 他の病院を受診する場合や薬局などで他のお薬やサプリメントを購入する場合は、必ず除菌治療のお薬を服用中であることを医師または薬剤師に伝えてください。




▶ 副作用について

次のような症状があらわれた場合には、**すぐにお薬の服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。**



発熱



腹痛を伴う下痢



便に血が混ざっている



発疹やかゆみ

尚、軟便や軽い下痢または味覚異常があらわれた場合には、残りのお薬を最後まで服用してください。お薬を飲み終われば症状はなくなります。ただし、**服用を続けているうちに下痢、味覚異常がひどくなった場合には、医師または薬剤師に相談してください。**

これら以外にも気になる症状があらわれた場合には、**自分の判断でお薬の服用を中止するのではなく、医師または薬剤師に相談してください。**

ピロリ菌の除菌治療 を受ける方へ

ピロリ菌の除菌治療では、胃酸を抑えるお薬と2種類の抗菌剤を服用します。ピロリ菌を除菌すると、胃潰瘍・十二指腸潰瘍などピロリ菌が関連する病気の治療や予防が期待できます。

▶ 除菌治療を始める前の注意点

次の方は事前に医師または薬剤師に相談してください。

- これまでにお薬を飲んでアレルギー症状を起こしたことのある方
- 他に服用中のお薬（一般用医薬品を含む）やサプリメントがある方

▶ 除菌治療中の注意点

- 3種類のお薬を**1日2回、7日間**、医師または薬剤師に指示されたスケジュールどおりに服用してください。
- 自分の判断でお薬を減らしたり、服用を中止したりしないでください。
- 2回目の除菌治療を受ける方は、治療中はアルコールの摂取をしないでください。
- 他の病院を受診する場合や薬局などで他のお薬やサプリメントを購入する場合は、必ず除菌治療のお薬を服用中であることを医師または薬剤師に伝えてください。




▶ 副作用について

次のような症状があらわれた場合には、**すぐにお薬の服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。**



発熱



腹痛を伴う下痢



便に血が混ざっている



発疹やかゆみ

尚、軟便や軽い下痢または味覚異常があらわれた場合には、残りのお薬を最後まで服用してください。お薬を飲み終われば症状はなくなります。ただし、**服用を続けているうちに下痢、味覚異常がひどくなった場合には、医師または薬剤師に相談してください。**

これら以外にも気になる症状があらわれた場合には、**自分の判断でお薬の服用を中止するのではなく、医師または薬剤師に相談してください。**