

「使用上の注意」改訂のお知らせ

プロトンポンプインヒビター

日本薬局方 ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊錠

ランソプラゾール OD 錠 15mg 「NIG」

ランソプラゾール OD 錠 30mg 「NIG」

製造販売元 日医工岐阜工場株式会社

販売元 日 医 工 株 式 会 社

プロトンポンプインヒビター

日本薬局方 ランソプラゾール腸溶カプセル

ランソプラゾールカプセル 15mg 「NIG」

ランソプラゾールカプセル 30mg 「NIG」

製造販売元 日医工岐阜工場株式会社

販売元 日 医 工 株 式 会 社

この度、上記製品において、「使用上の注意」の一部を改訂（下線部）しましたので、お知らせ申し上げます。今後の弊社製品のご使用に際しましては、下記内容をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂内容>（                    ：自主改訂による削除箇所）

改訂後			改訂前		
2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） 2.1 本剤の成分に対する過敏症の既往歴のある患者 2.2 リルピビリン塩酸塩を投与中の患者 [10.1 参照]			2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） 2.1 本剤の成分に対する過敏症の既往歴のある患者 2.2 <u>アタザナビル硫酸塩、リルピビリン塩酸塩</u> を投与中の患者 [10.1 参照]		
10. 相互作用 省略（変更なし） 10.1 併用禁忌（併用しないこと）			10. 相互作用 省略 10.1 併用禁忌（併用しないこと）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
		削除→	<u>アタザナビル硫酸塩</u> <u>レイアタツ</u> <u>[2.2 参照]</u>	<u>アタザナビル硫酸塩</u> <u>の作用を減弱するお</u> <u>それがある。</u>	<u>本剤の胃酸分泌抑制</u> <u>作用によりアタザナ</u> <u>ビル硫酸塩の溶解性</u> <u>が低下し、アタザナ</u> <u>ビルの血中濃度が低</u> <u>下する可能性がある。</u>
リルピビリン塩酸塩 エジュラント [2.2 参照]		省略（変更なし）	リルピビリン塩酸塩 エジュラント [2.2 参照]		省略

### <改訂理由>

・すでに販売中止・経過措置期間満了となっている「アタザナビル硫酸塩」を 2. 禁忌及び 10.1 併用禁忌から削除しました。

### <GS1 バーコード>

最新の注意事項等情報につきましては、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ<sup>®</sup>」で下記 GS1 バーコードを読み取ることで、スマートフォンやタブレット端末でご覧いただけます。

なお、「添文ナビ<sup>®</sup>」アプリにつきましては、ご使用になれる端末に合わせて「App Store」または「Google Play」よりダウンロードしてください。

ランソプラゾール OD 錠「NIG」   
(01)14987376610404

ランソプラゾールカプセル「NIG」   
(01)14987123876220

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE (DSU) 医薬品安全対策情報 No.338」(2025 年 8 月発行)に掲載の予定です。

また、改訂後の電子化された添付文書は医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/>) ならびに弊社ホームページ「医療関係者の皆さまへ」(<https://www.nichiiko.co.jp/medicine/>)に掲載されます。