

患者向け使用説明書変更のご案内

ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」

医療関係者 各位

謹 啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さてこの度、弊社販売の『ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」』につきまして、患者向け使用説明書を変更いたしましたので下記の通りご案内申し上げます。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹 白

記

1. 変更内容

■患者向け使用説明書

・デザインおよび文言を変更し、日医工株式会社のロゴを追記しました。(下記の図をご参照ください。)

* 図(原寸大ではありません。上:表面、下:裏面)

変更前	変更後
デザインを変更しました。	
<p style="text-align: right;">患者さまへ</p> <p>血行促進・皮膚保湿剤 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%の使い方</p> <ul style="list-style-type: none"> ●このおくすりは皮膚の水分を保持し潤いを保ちます。 ●大人の人差し指の先から第1関節まで押出した量(約0.5g)は大人の手のひら2つ分の面積を塗布できます。(右図)  <p>ご使用に際しての注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●傷口や皮膚がただれているところ(潰瘍やびらん面)には塗らないでください。 ●目の中や目の周辺には塗らないでください。万一、目に入った場合には、直ちにきれいな水で洗い流し、違和感があれば医師にご相談ください。 ●皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。 ●この薬を口に入れないでください。 ●使用後は、しっかりキャップをしめ、なるべく涼しいところで保管してください。 ●お子様の手の届かないところに保管してください。  <p style="text-align: center;">041310 (工場用コード)</p>	<p style="text-align: center;">ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」を 使用されている方へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●このおくすりは皮膚の水分を保持し潤いを保ちます。 ●大人の人差し指の先から第1関節まで押出した量(約0.5g)は大人の手のひら2つ分の面積に塗布できます(右図)  <p>ご使用に際しての注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●目の中や目の周辺には塗らないでください。万一、目に入った場合には、直ちにきれいな水で洗い流し、違和感があれば医師にご相談ください。 ●傷口や皮膚のただれているところ(潰瘍やびらん面)には塗らないでください。 ●皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。 ●この薬を口に入れないでください。 ●使用後は、しっかりキャップをしめ、なるべく涼しいところで保管してください。 ●お子様の手の届かないところに保管してください。  <p style="text-align: center;">051606 (工場用コード)</p>
順序を入れ替えました。	

File No. 20161213bI6

変更前

患者さまへ

●医師の指示に従い
1日に1～数回(朝、昼、夕方、お風呂上がり、寝る前など)
適量を患部にのばすように塗ってください。



おくすりの
塗り方の目安

入浴後5分以内が効果的

●かゆみは皮膚の乾燥とともに出てきます。
お風呂上りやシャワーの後に水滴を拭き取り、
5分以内に塗り付けて繰り返すと効果的です。

指先ではなく
手のひらで塗ります

●塗り残しがないように手のひらで
患部全体に塗ってください。

身体のしわの方向に塗ります

●おくすりは、皮膚のしわの方向
(骨に対して横向き)にそって塗ると
皮膚全体に広がりやすくなります。

「外用薬の正しい使い方(九州大学大学院 皮膚科学 古江増隆教授 監修)」より一部転載
2015年4月作成 N201500072

➔

変更後

患者さまへ

●医師の指示に従い
1日に1～数回(朝、昼、夕方、お風呂上がり、寝る前など)
適量を患部にのばすように塗ってください。



おくすりの
塗り方の目安

入浴後5分以内が効果的

●かゆみは皮膚の乾燥とともに出てきます。
お風呂上りやシャワーの後に水滴を拭き取り、
5分以内にのばすように塗ると効果的です。

指先ではなく
手のひらで塗ります

●塗り残しがないように手のひらで
患部全体に塗ってください。

身体のしわの方向に塗ります

●おくすりは、皮膚のしわの方向
(骨に対して横向き)にそって塗ると
皮膚全体に広がりやすくなります。

「外用薬の正しい使い方(九州大学大学院 皮膚科学 古江増隆教授 監修)」より一部転載
2015年4月作成 N201500072

日医工株式会社

文言を変更しました。

社名を追記しました。

■個装箱

・可変 GS1 コードを追記しました。

2. 変更品の開始ロットおよび出荷時期

包装規格	統一商品コード	調剤包装単位コード	販売包装単位コード	変更ロット	使用期限	出荷開始時期
25g×10本	376-61621-8	04987376616256	14987376616215	JG39	2019年10月	2017年1月上旬
25g×50本	376-61622-5	04987376616256	14987376616222	KG04	2019年11月	2017年2月中旬

・流通在庫の関係から予定時期が前後することがありますが、何卒ご了承ください。

以上