

▶ 副作用について

- このお薬の服用により、次のような症状があらわれることがあります。



この他にも気になる症状があらわれた場合や、わからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

▶ 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。



プソフェキ配合錠「SANIK」 を服用される方へ

このお薬は、
**アレルギー性鼻炎のくしゃみ・鼻水をやわらげる成分と
鼻づまりを改善する成分の2種類を配合したお薬です。**

先発医薬品と**原薬、添加物および製法などが同一の
オーソライズド・ジェネリック医薬品***です。

(*先発医薬品メーカーの許諾を受けたジェネリック医薬品)



プソフェキ配合錠「SANIK」

▶ 飲み方について

- **1日2回、1回2錠ずつ、朝と夕の空腹時**に服用してください。**

このお薬は、食事の後に服用すると吸収が悪くなり、効きめが弱くなる可能性があります。

食後すぐの時間を避け、**朝の起床時**や**夕食の前**などに服用してください。

（**空腹時とは、食事の直後以外の、胃の中に食べ物があまり入っていない時のことです。お腹がすいている時の意味ではありません。）



- このお薬は**噛んだり、砕いたりせず、水と一緒にそのまま服用してください。**



- 飲み忘れに気づいても、決して**2回分を一度に服用しないでください。**



▶ 服用中の注意点

- **便の中にお薬の殻が出ることがあります。**これはお薬の成分が吸収された後の残りです。
効果に影響はありませんのでご安心ください。
- アレルギー性鼻炎の治療では、症状に合わせたお薬を選んでもらうことが大切です。
このお薬の服用後の症状の変化について医師にしっかり伝えてください。
- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。
他の病院を受診する場合や、薬局で他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**

