

2026年3-4月

日 医 工 株 式 会 社  
富 山 市 総 曲 輪 1 丁 目 6 番 21

「使用上の注意」改訂のお知らせ

HMG-CoA 還元酵素阻害剤

処方箋医薬品<sup>注)</sup>

日本薬局方 ロスバスタチンカルシウム錠

ロスバスタチン錠 2.5mg 「日医工」

ロスバスタチン錠 5mg 「日医工」

ロスバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠

ロスバスタチン OD 錠 2.5mg 「日医工」

ロスバスタチン OD 錠 5mg 「日医工」

製造販売元 日 医 工 株 式 会 社

HMG-CoA 還元酵素阻害剤

処方箋医薬品<sup>注)</sup>

日本薬局方 ロスバスタチンカルシウム錠

ロスバスタチン錠 2.5mg 「NIG」

ロスバスタチン錠 5mg 「NIG」

製造販売元 日医工岐阜工場株式会社

販売元 日 医 工 株 式 会 社

HMG-CoA 還元酵素阻害剤

処方箋医薬品<sup>注)</sup>

ロスバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠

ロスバスタチン OD 錠 2.5mg 「TCK」

ロスバスタチン OD 錠 5mg 「TCK」

製造販売元 辰巳化学株式会社

発売元 日 医 工 株 式 会 社

注) 注意-医師等の処方箋により使用すること

この度、上記製品において、「使用上の注意」の一部を改訂（下線部）しましたので、お知らせ申し上げます。今後の弊社製品のご使用に際しましては、下記内容をご高覧くださいようお願い申し上げます。

<改訂内容> ( : 自主改訂)

改訂後			改訂前		
10. 相互作用 省略 (変更なし)			10. 相互作用 省略		
10.2 併用注意 (併用に注意すること)			10.2 併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
省略 (変更なし)			省略		
タファミジス	省略 (変更なし)		タファミジス	省略	
ベルモスジル	本剤とベルモスジルを併用したとき、本剤の AUC <sub>0-last</sub> が 4.62 倍、C <sub>max</sub> が 3.59 倍上昇したとの報告がある。	ベルモスジルの BCRP 及び OATP1B1 阻害作用により、本剤の血中濃度が上昇する可能性がある。	←追記		
モメロチニブ	本剤とモメロチニブを併用したとき、本剤の AUC <sub>inf</sub> が 2.7 倍、C <sub>max</sub> が 3.2 倍上昇したとの報告がある。	モメロチニブの BCRP 阻害作用により、本剤の血中濃度が上昇する可能性がある。			

※上記新旧対照表はロスバスタチン錠「日医工」の例となっております。改訂箇所の挿入位置等につきましては、改訂後の各電子添文にてご確認ください。

<改訂理由>

- ・相互作用相手薬の「使用上の注意」との整合を図るため、10.2 併用注意に「ベルモスジル、モメロチニブ」を追記しました。

<GS1 バーコード>

最新の注意事項等情報につきましては、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ®」で下記 GS1 バーコードを読み取ることで、スマートフォンやタブレット端末でご覧いただけます。

なお、「添文ナビ®」アプリにつきましては、ご使用になれる端末に合わせて「App Store」または「Google Play」よりダウンロードしてください。

ロスバスタチン錠「日医工」  (01)14987376001509

ロスバスタチン OD 錠「日医工」  (01)14987376111802

ロスバスタチン錠「NIG」  (01)14987376708866

ロスバスタチン OD 錠「TCK」  (01)14987123416471

今回の改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE (DSU) 医薬品安全対策情報 No.344」(2026 年 4 月発行)に掲載の予定です。

また、改訂後の電子化された添付文書は医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/>) ならびに弊社ホームページ「医療関係者の皆さまへ」(<https://www.nichiiko.co.jp/medicine/>)に掲載されます。

ロスバスタチン 25-045A