



新発売のご案内

アレンドロン酸錠5mg「NIG」 アレンドロン酸錠35mg「NIG」

この度、2021年8月1日に、日医工岐阜工場株式会社が武田テバファーマ株式会社より製造販売承認を承継しました『アレンドロン酸錠5mg/35mg「NIG」』につきまして、弊社にて販売を開始いたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

2021年8月

記

1 新発売品目

アレンドロン酸錠5mg「NIG」 PTP100錠

アレンドロン酸錠35mg「NIG」 患者さん用パッケージ付きPTP20錠（2錠×10）

（以上2製品 製造販売元：日医工岐阜工場株式会社、販売元：日医工株式会社）

2 発売日

2021年9月21日（火）

3 お知らせ表示

アレンドロン酸錠5mg「NIG」 PTP100錠：販売名変更品 製造販売元変更品 個装箱変更品

アレンドロン酸錠35mg「NIG」 PTP20錠（2錠×10）：販売名変更品 製造販売元変更品

*個装箱に製造販売元変更に伴う、お知らせ表示を行います。

4 製品情報

■基本情報

- ・薬効分類：骨粗鬆症治療剤
- ・規制区分：劇薬、処方箋医薬品
- ・貯 法：室温保存
- ・使用期限：3年
- ・標準品：フォサマック[®]錠5/35mg、ボナロン[®]錠5mg/35mg

■薬価、各種コード

製品名	日本薬局方 アレンドロン酸ナトリウム錠 アレンドロン酸錠5mg「NIG」
薬価(円)	23.50/5mg1錠
薬価基準収載医薬品コード(YJコード)	3999018F1196
レセプトコード(個別)	621896803
包装規格	PTP100錠
包装薬価(円)	2,350.00
HOT13	1189681030101
統一商品コード	376-71011-4
調剤包装単位コード	04987376710121
販売包装単位コード	14987376710111

製品名	日本薬局方 アレンドロン酸ナトリウム錠 アレンドロン酸錠35mg「NIG」
薬価(円)	144.00/35mg1錠
薬価基準収載医薬品コード(YJコード)	3999018F2192
レセプトコード(個別)	622101603
包装規格	患者さん用パッケージ付きPTP20錠(2錠×10)
包装薬価(円)	2,880.00
HOT13	1210163030101
統一商品コード	376-71001-5
調剤包装単位コード	04987376710022
販売包装単位コード	14987376710012

■サイズ・重量・入数

製品名	包装規格	個装箱		元梱包		
		サイズ(mm)	重量(g)	サイズ(mm)	重量(g)	入数
アレンドロン酸錠 5mg「NIG」	PTP100錠	111×49×35	50	477×276×215	5,488	100
アレンドロン酸錠 35mg「NIG」	PTP20錠 (2錠×10)	125×80×40	110	397×342×240	7,141	60

■仕様

- ・製造販売元変更に伴い、包装デザインを変更します。

アレンドロン酸錠5mg「NIG」

【PTPシート】(83×31 (mm))

【本体】



【アルミピロー】



【患者様向け指導箋】

【PTP100錠 個装箱】

〈表〉

アレンドロン酸錠5mg「NIG」の飲み方

お薬の効果を最大限に引き出し、口の中と食道の副作用を減らすため、次の飲み方を必ず守って下さい。

- 毎朝、起きたときに（食事の前に）1錠をコップ1杯（約180cc）の水（またはぬるま湯）で飲んでください。
- このお薬を噛んだり、口の中で溶かしたりしないで下さい。

N202100331
2021年8月作成

日医工株式会社

うら亜へ→

〈裏〉

- 飲んでから少なくとも30分間は横にならず、水以外の飲食、他のお薬の服用は避けて下さい。（飲んでから30分以上経って横になる場合は、最初の食事をとってからにして下さい。）
- 飲み込みにくく感じたり、飲み込むときの痛み、胸痛、胸やけのような症状に気づいた場合は、服用を中止し、すぐに主治医または薬剤師に相談して下さい。
- 歯医者さんで診察を受ける場合は、必ずこの薬を飲んでいいることをお伝え下さい。

飲み方についてご質問がある場合は、主治医または薬剤師にご相談下さい。 B



アレンドロン酸錠35mg「NIG」

【本体】




【シート内PTP】

〈表〉




〈裏〉




【PTP2錠シート】(120×75 (mm))

〈表〉



〈裏〉



【患者様向け指導箋】

〈表〉

アレンドロン酸錠 35mg「NIG」 「のみ方とご注意」

このお薬は週1回1錠を決められた曜日にのんでください。
(毎日のお薬ではありません。)

- のみ忘れた場合には、気づいた日の翌朝に1錠のんでください。次からは、あらかじめ決められた曜日にのんでください。
- 同じ日に2錠のまないでください。
- 胸やけ、のみ込む時の痛み、のみ込みにくさを感じた場合には、すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。

〈裏〉

- 朝、起きたときに(食事の前に)1錠をコップ1杯(約180cc)の水(またはぬるま湯)でのんでください。
- このお薬を嚥下し、口の中で溶かしたりしないでください。
- のんでから少なくとも30分間は横にならず、水以外の飲食、他のお薬の服用は避けてください。(のんでから30分以上経って横になる場合は、最初の食事をとってからにしてください。)
- 歯医者さんで診察を受ける場合は、必ずこの薬をのんでいることをお伝えください。

日医工株式会社

PQ044501
N202100332
2021年8月作成

【PTP20錠(2錠×10) 個装箱】



以上