お知らせ（メサラジン徐放錠250mg「日医工P」
メサラジン徐放錠500mg「日医工P」）

○このお薬は、かまずに飲んでください。
○このお薬を飲むと、糞便中に白いものが見られることがありますが、コーティング剤ですので、問題ありません。

日医工株式会社
NICHI-IKO

N202000369
2021年2月作成
PQ032401

お知らせ（メサラジン徐放錠250mg「日医工P」
メサラジン徐放錠500mg「日医工P」）

○このお薬は、かまずに飲んでください。
○このお薬を飲むと、糞便中に白いものが見られることがありますが、コーティング剤ですので、問題ありません。

日医工株式会社
NICHI-IKO

N202000369
2021年2月作成
PQ032401

お知らせ（メサラジン徐放錠250mg「日医工P」
メサラジン徐放錠500mg「日医工P」）

○このお薬は、かまずに飲んでください。
○このお薬を飲むと、糞便中に白いものが見られることがありますが、コーティング剤ですので、問題ありません。

日医工株式会社
NICHI-IKO

N202000369
2021年2月作成
PQ032401

お知らせ（メサラジン徐放錠250mg「日医工P」
メサラジン徐放錠500mg「日医工P」）

○このお薬は、かまずに飲んでください。
○このお薬を飲むと、糞便中に白いものが見られることがありますが、コーティング剤ですので、問題ありません。

日医工株式会社
NICHI-IKO

N202000369
2021年2月作成
PQ032401

お知らせ（メサラジン徐放錠250mg「日医工P」
メサラジン徐放錠500mg「日医工P」）

○このお薬は、かまずに飲んでください。
○このお薬を飲むと、糞便中に白いものが見られることがありますが、コーティング剤ですので、問題ありません。

日医工株式会社
NICHI-IKO

N202000369
2021年2月作成
PQ032401

お知らせ（メサラジン徐放錠250mg「日医工P」
メサラジン徐放錠500mg「日医工P」）

○このお薬は、かまずに飲んでください。
○このお薬を飲むと、糞便中に白いものが見られることがありますが、コーティング剤ですので、問題ありません。

日医工株式会社
NICHI-IKO

N202000369
2021年2月作成
PQ032401

お知らせ（メサラジン徐放錠250mg「日医工P」
メサラジン徐放錠500mg「日医工P」）

○このお薬は、かまずに飲んでください。
○このお薬を飲むと、糞便中に白いものが見られることがありますが、コーティング剤ですので、問題ありません。

日医工株式会社
NICHI-IKO

N202000369
2021年2月作成
PQ032401

お知らせ（メサラジン徐放錠250mg「日医工P」
メサラジン徐放錠500mg「日医工P」）

○このお薬は、かまずに飲んでください。
○このお薬を飲むと、糞便中に白いものが見られることがありますが、コーティング剤ですので、問題ありません。

日医工株式会社
NICHI-IKO

N202000369
2021年2月作成
PQ032401

お知らせ（メサラジン徐放錠250mg「日医工P」
メサラジン徐放錠500mg「日医工P」）

○このお薬は、かまずに飲んでください。
○このお薬を飲むと、糞便中に白いものが見られることがありますが、コーティング剤ですので、問題ありません。

日医工株式会社
NICHI-IKO

N202000369
2021年2月作成
PQ032401

お知らせ（メサラジン徐放錠250mg「日医工P」
メサラジン徐放錠500mg「日医工P」）

○このお薬は、かまずに飲んでください。
○このお薬を飲むと、糞便中に白いものが見られることがありますが、コーティング剤ですので、問題ありません。

日医工株式会社
NICHI-IKO

N202000369
2021年2月作成
PQ032401

お知らせ（メサラジン徐放錠250mg「日医工P」
メサラジン徐放錠500mg「日医工P」）

○このお薬は、かまずに飲んでください。
○このお薬を飲むと、糞便中に白いものが見られることがありますが、コーティング剤ですので、問題ありません。

日医工株式会社
NICHI-IKO

N202000369
2021年2月作成
PQ032401

お知らせ（メサラジン徐放錠250mg「日医工P」
メサラジン徐放錠500mg「日医工P」）

○このお薬は、かまずに飲んでください。
○このお薬を飲むと、糞便中に白いものが見られることがありますが、コーティング剤ですので、問題ありません。

日医工株式会社
NICHI-IKO

N202000369
2021年2月作成
PQ032401

お知らせ（メサラジン徐放錠250mg「日医工P」
メサラジン徐放錠500mg「日医工P」）

○このお薬は、かまずに飲んでください。
○このお薬を飲むと、糞便中に白いものが見られることがありますが、コーティング剤ですので、問題ありません。

日医工株式会社
NICHI-IKO

N202000369
2021年2月作成
PQ032401