

# イマチニブ錠「NIG」 を服用される方へ

## ▶ 飲み方について

- 主治医または薬剤師の指示通りに服用してください。自己判断で服用を中止したり、服用量をかえたりしないでください。
- 胃などへの負担を軽くするために、**食後にコップ1杯(200cc)程度の多めの水またはぬるま湯で服用してください。**
- 飲み忘れに気づいた場合は、その分のお薬は服用しないでください。決して**2回分を一度に服用しないでください。**

## ▶ 服用中の注意点

- めまいや眠気、目のかすみなどがあらわれることがあるので、**高所での作業や自動車の運転などの危険を伴う機械の操作をする場合は十分注意してください。**



- 妊娠が可能な場合、**このお薬を服用している間は避妊をするようにしてください。**
- お薬の効果の確認や副作用を早めに発見するために、**定期的に診察・検査を受けてください。**
- **グレープフルーツジュースやセイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)を含む食品は避けてください。このお薬に影響します。**

- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**

## ▶副作用について

- 急激な体重増加や呼吸困難などがあらわれた場合は、ただちに受診してください。**



- 次の症状に気づいたら、主治医または薬剤師に連絡してください。

出血しやすい、  
出血がとまりにくい



発熱、悪寒



吐き気、  
嘔吐



発疹、  
かゆみ



筋肉のけいれん、  
筋肉痛



この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**主治医または薬剤師に気軽に相談してください。**

## ▶保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。