

エキセメスタン錠「NIG」

を服用される方へ

このお薬は、閉経後の乳がん治療のお薬です。

飲み方について

- **1日1回1錠を食後**に服用してください。
1度服用するタイミングを決めたら、毎日
できるだけ同じタイミングで服用してください。




服用上の注意点

- 飲み忘れた場合は、気づいた時に飲むようにしてください。
ただし、次の服用時間が近い場合は飲まずに、次の服用時間
に1回分を服用してください。
絶対に2回分を一度に服用しないでください。
- 1度に多く服用してしまった場合は、
医師または薬剤師に相談してください。
- 医師に指示された服用期間を守り、
自分の判断で服用をやめないでください。



服用中の注意点

- このお薬を服用すると骨からカルシウムが失われ、骨粗鬆症が
起こりやすくなります。**定期的に骨密度の
検査を受ける**ようにしてください。
- このお薬の服用で、**眠気やめまいがあらわ
れた場合には自動車の運転などの危険を
伴う機械の操作はしないでください。**



副作用について

エキセメスタン錠「NIG」を服用していると、下記のような副作用があらわれることがあります。

ほてり



多汗



関節痛



高血圧



倦怠感



この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

保管等に関する注意点

- 光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。



日医工株式会社

