

エパルレスタット錠50mg「NIG」 を服用される方へ

このお薬は糖尿病の合併症である末梢神経障害による症状（手足のしびれや痛みなど）を和らげ、病態が進行することを抑えます。医師の指示通りに服用を続けてください。

このお薬の服用中に
**尿が黄褐色または赤色になることがあります、
薬の成分の色によるものなので心配はありません。**

また、まれに以下のような症状があらわれることがあります。
このような場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

鼻 血



歯ぐきの出血



皮下出血



全身倦怠感



食欲不振



皮膚や白目が
黄色くなる



これら以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。



日医工 株式会社

2023年3月作成
N202300033

エパルレスタット錠50mg「NIG」 を服用される方へ

このお薬は糖尿病の合併症である末梢神経障害による症状（手足のしびれや痛みなど）を和らげ、病態が進行することを抑えます。医師の指示通りに服用を続けてください。

このお薬の服用中に
**尿が黄褐色または赤色になることがあります、
薬の成分の色によるものなので心配はありません。**

また、まれに以下のような症状があらわれることがあります。
このような場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

鼻 血



歯ぐきの出血



皮下出血



全身倦怠感



食欲不振



皮膚や白目が
黄色くなる



これら以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。



日医工 株式会社

2023年3月作成
N202300033

エパルレスタット錠50mg「NIG」 を服用される方へ

このお薬は糖尿病の合併症である末梢神経障害による症状（手足のしびれや痛みなど）を和らげ、病態が進行することを抑えます。医師の指示通りに服用を続けてください。

このお薬の服用中に
**尿が黄褐色または赤色になることがあります、
薬の成分の色によるものなので心配はありません。**

また、まれに以下のような症状があらわれることがあります。
このような場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

鼻 血



歯ぐきの出血



皮下出血



全身倦怠感



食欲不振



皮膚や白目が
黄色くなる



これら以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。



日医工 株式会社

2023年3月作成
N202300033

エパルレスタット錠50mg「NIG」 を服用される方へ

このお薬は糖尿病の合併症である末梢神経障害による症状（手足のしびれや痛みなど）を和らげ、病態が進行することを抑えます。医師の指示通りに服用を続けてください。

このお薬の服用中に
**尿が黄褐色または赤色になることがあります、
薬の成分の色によるものなので心配はありません。**

また、まれに以下のような症状があらわれることがあります。
このような場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

鼻 血



歯ぐきの出血



皮下出血



全身倦怠感



食欲不振



皮膚や白目が
黄色くなる



これら以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。



日医工 株式会社

2023年3月作成
N202300033