

# 日医工のエンテカビル錠を 服用される方とご家族の方へ

このお薬は、抗ウイルス薬とよばれるB型肝炎の治療薬です。B型肝炎ウイルス(HBV)が増殖するのを抑えて体の中のウイルス量を減らします。

## このお薬の飲み方

**1日1回1錠 空腹時にお飲みください。**

ラミブジン(B型肝炎の抗ウイルス薬)を服用していて効果が得られなくなった方では1回2錠が推奨されます。

\*飲む量は医師の指示にしたがってください。

## お薬を飲むときの注意

**必ず空腹時に飲んでください。**

食事と一緒に飲むと、お薬の効果が十分に得られなくなります。食事のあと2時間以上経ってから飲み、次の食事までは2時間以上空けるようにしてください。



## お薬を飲むときの注意

飲み忘れたり、自己判断で中止したりしないでください。

飲み忘れたり自己判断で中止したりすると再びウイルスが増えて、病気が進行してしまうことがあります。

### 《 飲み忘れた場合 》

気づいたときに**1回分を  
すぐに飲んで**ください。

次に飲む時間が近い場合は  
**1回分をとばして**  
ください。

決して  
**2回分を一度に  
飲まないで**ください。



- お薬を飲むことで他者へのHBV感染が避けられるわけではありません。
- 誤って飲み過ぎた場合は医師または薬剤師にご相談ください。
- 他院を受診する場合や、薬局などでお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。



## お薬の副作用に関して

以下のような副作用が現れることがあります。通常、このお薬による副作用であれば、いくつかの症状が同じ時期にあらわれます。

### 特に注意が必要な副作用（一例）



### その他の副作用



### お薬の中止後におこる症状

肝炎が悪化することによって、体がだるい、白目や皮膚が黄色くなる、吐き気・嘔吐、食欲不振、かゆみなどがおこります。

このような症状がある場合や他にも気になる症状がありましたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。



次のような方はお薬を飲む前に  
必ず医師に相談してください。

- 過去にこのお薬と同じ成分のお薬を飲んで、アレルギーなどの過敏症を経験したことのある方
- HIVに感染しているがその治療を受けていない方
- 女性で次に該当する方
  - ・妊婦または妊娠している可能性のある方
  - ・妊娠する可能性のある方
  - ・授乳中の方
- 次に該当する方
  - ・腎臓の働きが低下している方
  - ・肝臓の移植手術を受けた方
  - ・非代償性肝硬変と診断された方
  - ・高齢の方
  - ・他のお薬を飲んでいる方



### その他の注意事項

- 薬が余った場合は決して他の人に渡さず、処分方法について薬局などの医療機関に相談してください。
- 子どもの手の届かないところに保管してください。
- 高温・湿気・直射日光を避けて室温で保管してください。



日医工株式会社

NICHI-KO