副作用について

- このお薬の服用で、強い眠気や居眠り、不眠などがあらわれることがあります。症状がつらい場合には、主治医または薬剤師に相談してください。






この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**主治医または薬剤師に気軽に相談してください。**

保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。



日医工株式会社
NICHI-IKO

2026年9月作成　N202600159

オランザピン錠／OD錠「NIG」
を服用される方とご家族の方へ

服用する前に必ずお読みください

- このお薬は、**血糖値を著しく上昇させたり、低下させたりすることがある**ため、定期的に血糖値を測定する場合があります。特に**高血糖や肥満傾向の方、家族に糖尿病の方がいる方は注意してください。**
- 次の症状に気づいたら、**お薬の服用をやめてただちに受診してください。**



●激しいのどの渇き



●水やジュースをたくさん飲む



●何度もトイレに行く



●おしっこの量が多い



●体に力が入らない



●冷や汗がでる



●手足がふるえる



●意識がはっきりしない

また、体重が増加することがあります。**体重が増加し始めた場合は、主治医または薬剤師に相談してください。**


飲み方について

- **主治医または薬剤師の指示通りに服用してください。**自己判断で服用を中止したり、服用量を加減したりすると病気が悪化することがあります。
- 飲み忘れに気づいても、決して**2回分を一度に服用しないでください。**
- OD錠は水なしでも服用することができます。舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。ただし、**水なしの場合には寝たままで服用しないでください。**



服用中の注意点

- 眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下がおこることがあるので、**高所での作業や自動車の運転などの危険を伴う機械の操作はしないでください。**



- **飲酒と喫煙はこのお薬に影響します**ので、主治医または薬剤師に確認してください。
- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**



<双極性障害におけるうつ状態を有する方とご家族の方へ>

- うつ病やうつ状態の人は死んでしまいたいと感じることがあります。このお薬の服用中に**死んでしまいたいという気持ちが強くなったり、興奮しやすくなったり、攻撃的になったりした場合は、主治医に相談してください。**

