日医工株式会社
NICHI-IKO 富山市総曲輪一丁目6番21
2024 年 9 月作成

製造販売元：日医工岐阜工場株式会社

溶出試験

ケトチフェンカプセル 1mg「NIG」

溶出試験条件

装置	日本薬局方 溶出試験法 パドル法	液量	900mL	温度	37±0.5℃

溶出試験結果

回転数	試験液	判定
50rpm	pH1.2	標準製剤及び本品はともに 15 分以内に平均 85%以上溶出した。
	pH4.0	標準製剤及び本品はともに 15 分以内に平均 85%以上溶出した。
	pH6.8	標準製剤の平均溶出率が 60%及び 85%付近の 2 時点において，本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあった。
	水	標準製剤及び本品はともに 15 分以内に平均 85%以上溶出した。
ケトチフェンカプセル 1mg「NIG」の溶出挙動を標準製剤（ザジテンカプセル 1mg）と比較した結果，上記全ての条件において「生物学的同等性試験ガイドライン」の判定基準に適合した。		


溶出率（%）
pH1.2（50rpm）
100
80
60
40
20
0
0
5
10
15
時間（分）
ケトチフェンカプセル1mg「NIG」
ザジテンカプセル1mg


溶出率（%）
pH4.0（50rpm）
100
80
60
40
20
0
0
5
10
15
時間（分）
ケトチフェンカプセル1mg「NIG」
ザジテンカプセル1mg


溶出率（%）
pH6.8（50rpm）
100
80
60
40
20
0
0
10
20
30
時間（分）
ケトチフェンカプセル1mg「NIG」
ザジテンカプセル1mg


溶出率（%）
水（50rpm）
100
80
60
40
20
0
0
5
10
15
時間（分）
ケトチフェンカプセル1mg「NIG」
ザジテンカプセル1mg