

サラゾスルファピリジン腸溶錠 「NIG」 を服用される方へ


このお薬は、関節リウマチの免疫異常を正常に近づけることで炎症症状をやわらげるお薬です。

▶ 飲み方について

- 主治医または薬剤師の指示通りに服用してください。このお薬は効果が得られるまでに1～2ヵ月かかる場合がありますが、自己判断でお薬をやめたり、服用量をかえたりしないでください。
- 腸で溶けるお薬です。かんだり砕いたりせず、そのまま服用してください。
- 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。

▶ 服用中の注意点

- 主治医の指示にしたがって定期的に検査を受けてください。
- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。



▶ 副作用について

- 次の症状に気づいたら、**お薬の服用をやめてすぐに主治医に連絡してください。**

◆皮膚の異常

発疹、紅斑、かゆみ、水ぶくれ、皮下出血、青あざ など



◆かぜのような症状

発熱、せき、息苦しさ、のどの痛み など



◆その他の異常

食欲がない、むかむかする、下痢、体がだるい、むくみ、尿の量が減る、皮膚や白目が黄色くなる、目の充血、口内炎、首のこわばり など



この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**主治医または薬剤師に気軽に相談してください。**

▶ 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。

サラゾスルファピリジン腸溶錠 「NIG」 を服用される方へ


このお薬は、関節リウマチの免疫異常を正常に近づけることで炎症症状をやわらげるお薬です。

▶ 飲み方について

- 主治医または薬剤師の指示通りに服用してください。このお薬は効果が得られるまでに1～2ヵ月かかる場合がありますが、自己判断でお薬をやめたり、服用量をかえたりしないでください。
- 腸で溶けるお薬です。かんだり砕いたりせず、そのまま服用してください。
- 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。

▶ 服用中の注意点

- 主治医の指示にしたがって定期的に検査を受けてください。
- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。



▶ 副作用について

- 次の症状に気づいたら、**お薬の服用をやめてすぐに主治医に連絡してください。**

◆皮膚の異常

発疹、紅斑、かゆみ、水ぶくれ、皮下出血、青あざ など



◆かぜのような症状

発熱、せき、息苦しさ、のどの痛み など



◆その他の異常

食欲がない、むかむかする、下痢、体がだるい、むくみ、尿の量が減る、皮膚や白目が黄色くなる、目の充血、口内炎、首のこわばり など



この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**主治医または薬剤師に気軽に相談してください。**

▶ 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。