ジスチグミン臭化物錠「NIG」
を服用される方とそのご家族へ

必ずお読みください

このお薬について

- 膀胱の筋肉の働きを強め、排尿障害（おしっこの出が悪くなっている）を改善します。
- 全身の筋肉の働きを強め、重症筋無力症の症状を改善します。

副作用について

飲み始めの2週間は特にご注意ください。

- 吐き気がする・吐く
- おなかが痛くなる・下痢が続く
- つば・痰や涙が多くなる
- 汗をたくさんかく
- 脈がおそくなる
- ものが見えにくい
- 息がくるしくなる



このような症状に気づいたときは、服用を中止し、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

裏面もお読みください

お薬をお飲みになる前に

次のような方は、医師または薬剤師にお伝えください。

- 過去にこのお薬に含まれる成分で、過敏な反応を経験したことがある
- 消化管または尿路に閉塞がある

服用中の注意点

- 飲み忘れた場合、後から**2回分を一度に飲むのはおやめください。**次の服用時に1回分を飲んでください。
- ご自分の判断でお薬を飲んだり、飲まなかったりすることはやめてください。
- 長い間、服用されている方でも副作用の症状がみられることがあるので注意してください。

何かわからないこと、気になることがある場合、またお薬を飲んで何か体調がおかしいと感じた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

日医工株式会社
NICHI-IKO

2026年10月作成　N202600168

ジスチグミン臭化物錠「NIG」
を服用される方とそのご家族へ
必ずお読みください
このお薬について
膀胱の筋肉の働きを強め、排尿障害（おしっこの出が悪くなっている）を改善します。
全身の筋肉の働きを強め、重症筋無力症の症状を改善します。
副作用について
飲み始めの2週間は特にご注意ください。
吐き気がする・吐く
おなかが痛くなる・下痢が続く
つば・痰や涙が多くなる
汗をたくさんかく
脈がおそくなる
ものが見えにくい
息がくるしくなる



このような症状に気づいたときは、服用を中止し、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
裏面もお読みください
お薬をお飲みになる前に
次のような方は、医師または薬剤師にお伝えください。
過去にこのお薬に含まれる成分で、過敏な反応を経験したことがある
消化管または尿路に閉塞がある
服用中の注意点
飲み忘れた場合、後から2回分を一度に飲むのはおやめください。次の服用時に1回分を飲んでください。
ご自分の判断でお薬を飲んだり、飲まなかったりすることはやめてください。
長い間、服用されている方でも副作用の症状がみられることがあるので注意してください。
何かわからないこと、気になることがある場合、またお薬を飲んで何か体調がおかしいと感じた場合は、医師または薬剤師に相談してください。
日医工株式会社
NICHI-IKO
2026年10月作成　N202600168

ジスチグミン臭化物錠「NIG」
を服用される方とそのご家族へ

必ずお読みください

このお薬について

- 膀胱の筋肉の働きを強め、排尿障害（おしっこの出が悪くなっている）を改善します。
- 全身の筋肉の働きを強め、重症筋無力症の症状を改善します。

副作用について

飲み始めの2週間は特にご注意ください。

- 吐き気がする・吐く
- おなかが痛くなる・下痢が続く
- つば・痰や涙が多くなる
- 汗をたくさんかく
- 脈がおそくなる
- ものが見えにくい
- 息がくるしくなる



このような症状に気づいたときは、服用を中止し、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

裏面もお読みください

お薬をお飲みになる前に

次のような方は、医師または薬剤師にお伝えください。

- 過去にこのお薬に含まれる成分で、過敏な反応を経験したことがある
- 消化管または尿路に閉塞がある

服用中の注意点

- 飲み忘れた場合、後から**2回分を一度に飲むのはおやめください。**次の服用時に1回分を飲んでください。
- ご自分の判断でお薬を飲んだり、飲まなかったりすることはやめてください。
- 長い間、服用されている方でも副作用の症状がみられることがあるので注意してください。

何かわからないこと、気になることがある場合、またお薬を飲んで何か体調がおかしいと感じた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

日医工株式会社
NICHI-IKO

2026年10月作成　N202600168

ジスチグミン臭化物錠「NIG」
を服用される方とそのご家族へ
必ずお読みください
このお薬について
膀胱の筋肉の働きを強め、排尿障害（おしっこの出が悪くなっている）を改善します。
全身の筋肉の働きを強め、重症筋無力症の症状を改善します。
副作用について
飲み始めの2週間は特にご注意ください。
吐き気がする・吐く
おなかが痛くなる・下痢が続く
つば・痰や涙が多くなる
汗をたくさんかく
脈がおそくなる
ものが見えにくい
息がくるしくなる



このような症状に気づいたときは、服用を中止し、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
裏面もお読みください
お薬をお飲みになる前に
次のような方は、医師または薬剤師にお伝えください。
過去にこのお薬に含まれる成分で、過敏な反応を経験したことがある
消化管または尿路に閉塞がある
服用中の注意点
飲み忘れた場合、後から2回分を一度に飲むのはおやめください。次の服用時に1回分を飲んでください。
ご自分の判断でお薬を飲んだり、飲まなかったりすることはやめてください。
長い間、服用されている方でも副作用の症状がみられることがあるので注意してください。
何かわからないこと、気になることがある場合、またお薬を飲んで何か体調がおかしいと感じた場合は、医師または薬剤師に相談してください。
日医工株式会社
NICHI-IKO
2026年10月作成　N202600168