

ジスチグミン臭化物錠5mg「NIG」を 服用される方とご家族の方へ

～飲まれる前に必ずお読みください～

- ジスチグミン臭化物錠は、膀胱の筋肉のはたらきを強め、排尿障害（おしっこの出が悪くなっている）を改善したり、全身の筋肉のはたらきを強め重症筋無力症を治療するお薬です。
- このお薬は目的の効果以外に望ましくない作用が出てくる場合がありますので、以下のことに注意してください。



服用されてから2週間は特にご注意ください。
高齢者の方、腎臓に障害のある方はご注意ください。

もしも次のような症状がみられましたら、直ちに服用をやめて、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

- | | | |
|--------------|-----------|----------|
| ○吐き気がする・吐く | ○おなかが痛くなる | ○下痢が続く |
| ○つば、痰や涙が多くなる | ○汗をたくさんかく | ○脈がおそくなる |
| ○ものが見えにくい | ○息がくるしくなる | |

（裏面の自覚症状もお読みください）



他にも、お薬を服用して、何か体調がおかしいと感じたら、医師または薬剤師にご相談ください。

裏面も必ず
お読みください



飲みはじめられてからのご注意

- ・ このお薬は指示された時間にお飲みください。
- ・ ご自分の判断でお薬を飲んだり、飲まなかったりすることはやめてください。
- ・ 飲み忘れても、後からまとめて飲むのはおやめください。指示された時間に飲み忘れたら、1回とばして次の指示された時間から服用してください。

- このお薬で特にご注意ください重大な副作用の、それぞれの主な自覚症状を以下にお示しします。これらの自覚症状に気づいたら、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

部位	自覚症状
全身	冷や汗、汗をたくさんかく、体がだるい、脈がとぶ、脈が乱れる、脈が遅くなる、気持ちが悪くなる
頭部	意識の低下、めまい、考えがまとまらない、判断力の低下
眼	周りが暗くなる、ものが見えにくくなる、涙がでる、ものがだぶって見える、上まぶたが下がる、まぶたが重い
口や喉 気管	つばや痰が多く出る、口が渇く、ものが飲みにくい、唇が青紫色～暗紫色になる
胸部	息苦しくなる、息切れ、胸がしめつけられる感じ、胸がおしつぶされるような感じ、胸を強く押さえつけられた感じ、胸の痛み
腹部	腹痛、吐き気
手・足	脈がとぶ、脈が乱れる、手足の爪が青紫色～暗紫色になる
皮膚	皮膚が青紫色～暗紫色になる
筋肉	筋肉のけいれん、筋肉の疲労感、力が入らない
便	下痢



日医工岐阜工場株式会社



日医工株式会社

ジスチグミン臭化物錠5mg「NIG」を 服用される方とご家族の方へ

～飲まれる前に必ずお読みください～

- ジスチグミン臭化物錠は、膀胱の筋肉のはたらきを強め、排尿障害（おしっこの出が悪くなっている）を改善したり、全身の筋肉のはたらきを強め重症筋無力症を治療するお薬です。
- このお薬は目的の効果以外に望ましくない作用が出てくる場合がありますので、以下のことに注意してください。



服用されてから2週間は特にご注意ください。
高齢者の方、腎臓に障害のある方はご注意ください。

もしも次のような症状がみられましたら、直ちに服用をやめて、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

- | | | |
|--------------|-----------|----------|
| ○吐き気がする・吐く | ○おなかが痛くなる | ○下痢が続く |
| ○つば、痰や涙が多くなる | ○汗をたくさんかく | ○脈がおそくなる |
| ○ものが見えにくい | ○息がくるしくなる | |

（裏面の自覚症状もお読みください）



他にも、お薬を服用して、何か体調がおかしいと感じたら、医師または薬剤師にご相談ください。

裏面も必ず
お読みください



飲みはじめられてからのご注意

- ・ このお薬は指示された時間にお飲みください。
- ・ ご自分の判断でお薬を飲んだり、飲まなかったりすることはやめてください。
- ・ 飲み忘れても、後からまとめて飲むのはおやめください。指示された時間に飲み忘れたら、1回とばして次の指示された時間から服用してください。

- このお薬で特にご注意ください重大な副作用の、それぞれの主な自覚症状を以下にお示しします。これらの自覚症状に気づいたら、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

部位	自覚症状
全身	冷や汗、汗をたくさんかく、体がだるい、脈がとぶ、脈が乱れる、脈が遅くなる、気持ちが悪くなる
頭部	意識の低下、めまい、考えがまとまらない、判断力の低下
眼	周りが暗くなる、ものが見えにくくなる、涙がでる、ものがだぶって見える、上まぶたが下がる、まぶたが重い
口や喉 気管	つばや痰が多く出る、口が渇く、ものが飲みにくい、唇が青紫色～暗紫色になる
胸部	息苦しくなる、息切れ、胸がしめつけられる感じ、胸がおしつぶされるような感じ、胸を強く押さえつけられた感じ、胸の痛み
腹部	腹痛、吐き気
手・足	脈がとぶ、脈が乱れる、手足の爪が青紫色～暗紫色になる
皮膚	皮膚が青紫色～暗紫色になる
筋肉	筋肉のけいれん、筋肉の疲労感、力が入らない
便	下痢



日医工岐阜工場株式会社



日医工株式会社