

# スクラルファート 内用液10%「NIG」 を飲む前の注意点



- このお薬は液体です。  
お薬の入っている袋をタテに  
持ち、切れ目に沿って完全に  
切りとってください。
- 正面から口につけて、ゆっくり  
袋をしぼるようにお飲みくだ  
さい。

※有効成分等が沈殿する  
ことがあります。

開封前によく振って  
お飲みください。



 日医工 株式会社

2021年12月作成 N202100322

# スクラルファート 内用液10%「NIG」 を飲む前の注意点



- このお薬は液体です。  
お薬の入っている袋をタテに  
持ち、切れ目に沿って完全に  
切りとってください。
- 正面から口につけて、ゆっくり  
袋をしぼるようにお飲みくだ  
さい。

※有効成分等が沈殿する  
ことがあります。

開封前によく振って  
お飲みください。



 日医工 株式会社

2021年12月作成 N202100322

# スクラルファート 内用液10%「NIG」 を飲む前の注意点



- このお薬は液体です。  
お薬の入っている袋をタテに  
持ち、切れ目に沿って完全に  
切りとってください。
- 正面から口につけて、ゆっくり  
袋をしぼるようにお飲みくだ  
さい。

※有効成分等が沈殿する  
ことがあります。

開封前によく振って  
お飲みください。



 日医工 株式会社

2021年12月作成 N202100322

# スクラルファート 内用液10%「NIG」 を飲む前の注意点



- このお薬は液体です。  
お薬の入っている袋をタテに  
持ち、切れ目に沿って完全に  
切りとってください。
- 正面から口につけて、ゆっくり  
袋をしぼるようにお飲みくだ  
さい。

※有効成分等が沈殿する  
ことがあります。

開封前によく振って  
お飲みください。



 日医工 株式会社

2021年12月作成 N202100322