

ゾニサミドOD錠TRE「日医工」 を服用される方、ご家族・介護者の方へ

このお薬は、パーキンソン病の運動症状やレビー小体型認知症に伴うパーキンソニズムを改善します。

▶ 飲み方について

- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。
- 飲み忘れに気付いても、決して2回分を一度に服用しないでください。
多く服用したとき、**意識の消失、片腕や足・顔の筋肉がビクッと
する、めまいなどの症状**があらわれることがあります。これらの
症状があらわれた場合は、すぐに受診してください。
- OD錠は水なしでも服用することができます。舌の上でだ液を含ませて軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。ただし、水なしの場合には寝たままで服用しないでください。

▶ 服用中の注意

- このお薬を服用すると、**眠気・集中力や
反射運動能力などの低下**がおこることがあります。**自動車の運転など危険を伴う
機械の操作は行わないでください。**



- 汗の量が少なくなることがあります。
体温が上昇し、熱中症になることがあるので、**高温になる場所
を出来るだけ避けてください。**特に夏季に体温が上昇することがある
ので注意してください。
**発汗が少なくなったり、体温が上昇したり、顔が赤くなったり、
意識障害があらわれた場合には、すぐに受診してください。**

- このお薬の服用中または中止後に、**死にたいと考える**ようになることがあります。このような気持ちになった場合には**医師に相談してください**。
- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局で他のお薬を購入する場合には、必ず**このお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください**。

▶副作用について

- 次の症状に気づいたら、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。



- この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、医師または薬剤師に気軽に相談してください。

▶保管等に関する注意点

- 直射日光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。