

本資料の情報に関する注意

本資料には試験方法等が確立していない内容も含まれており、あくまでも記載されている試験方法で得られた結果を事実として提示している。医療従事者が臨床適用を検討する上での参考情報であり、可否を示すものではない。

安定性試験

(無包装状態)

ゾニサミド OD 錠 50mgTRE「日医工」

無包装状態の安定性試験

ゾニサミド OD 錠 50mgTRE「日医工」の無包装状態における安定性を検討した結果 40℃、25℃・75%RH、曝光下の保存条件における各試験項目は全て規格内であった。

試験実施期間（硬度以外）：2022/10/17～2023/1/27

硬度：2024/2/22～2024/5/22

● 無包装 40℃ [気密容器]

(最小値～最大値)

試験項目 ＜規格＞	ロット 番号	保存期間				
		開始時	0.5 ヲ月	1 ヲ月	2 ヲ月	3 ヲ月
性状 n=1 ＜白色～帯黄白色の楕 円形の割線入り素錠＞	G61099	白色～帯黄白 色の楕円形の 割線入り素錠	白色～帯黄白 色の楕円形の 割線入り素錠	白色～帯黄白 色の楕円形の 割線入り素錠	白色～帯黄白 色の楕円形の 割線入り素錠	白色～帯黄白 色の楕円形の 割線入り素錠
崩壊性 (秒) n=6 ＜60 秒以内＞	G61099	16	13～15	15～17	18～20	15～18
溶出性 (%) n=6 ＜30 分, 80%以上＞	G61099	89.4～94.8	89.9～92.7	91.1～93.4	90.8～92.9	89.2～93.2
含量 (%) ※ n=3 ＜95.0～105.0%＞	G61099	97.43～98.51	96.47～97.35	96.5～97.32	97.27～99.82	97.22～99.29
(参考値) 硬度 (N) n=10	GW0317	128.2	115.8	125.6	119.4	120.1

※：表示量に対する含有率 (%)

● 無包装 25℃・75%RH [遮光・開放]

(最小値～最大値)

試験項目 ＜規格＞	ロット 番号	保存期間				
		開始時	0.5 ヶ月	1 ヶ月	2 ヶ月	3 ヶ月
性状 n=1 ＜白色～帯黄白色の楕円形の割線入り素錠＞	G61099	白色～帯黄白色の楕円形の割線入り素錠	白色～帯黄白色の楕円形の割線入り素錠	白色～帯黄白色の楕円形の割線入り素錠	白色～帯黄白色の楕円形の割線入り素錠	白色～帯黄白色の楕円形の割線入り素錠
崩壊性 (秒) n=6 ＜60 秒以内＞	G61099	16	10～11	12～13	11～13	10～13
溶出性 (%) n=6 ＜30 分, 80%以上＞	G61099	89.4～94.8	89.7～94.0	90.2～92.9	89.5～92.8	88.8～93.6
含量 (%) ※ n=3 ＜95.0～105.0%＞	G61099	97.43～98.51	96.80～97.22	96.91～97.61	98.52～99.01	97.62～99.21
(参考値) 硬度 (N) n=10	GW0317	128.2	83.5	92.8	85.8	87.3

※：表示量に対する含有率 (%)

● 無包装 25℃・60%RH・曝光量 120 万 Lx・hr [D65 光源 (1600Lx)・シャーレ (開放)]

(最小値～最大値)

試験項目 ＜規格＞	ロット 番号	総曝光量			
		開始時	30 万 Lx・hr	60 万 Lx・hr	120 万 Lx・hr
性状 n=1 ＜白色～帯黄白色の楕円形の割線入り素錠＞	G61099	白色～帯黄白色の楕円形の割線入り素錠	白色～帯黄白色の楕円形の割線入り素錠	白色～帯黄白色の楕円形の割線入り素錠	白色～帯黄白色の楕円形の割線入り素錠
崩壊性 (秒) n=6 ＜60 秒以内＞	G61099	16	11～12	11～12	13
溶出性 (%) n=6 ＜30 分, 80%以上＞	G61099	89.4～94.8	87.5～90.4	90.3～92.6	90.1～93.5
含量 (%) ※ n=3 ＜95.0～105.0%＞	G61099	97.43～98.51	98.01～98.54	97.22～98.68	97.92～98.48
(参考値) 硬度 (N) n=10	GW0317	128.2	100.3	94.3	95.8

※：表示量に対する含有率 (%)