

ゾニサミドOD錠TRE「日医工」 を服用される方、ご家族・介護者の方へ

このお薬は、パーキンソン病の運動症状やレビー小体型認知症に伴うパーキンソニズムを改善します。

▶ 飲み方について

- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。
- 飲み忘れに気付いても、決して2回分を一度に服用しないでください。
多く服用したとき、意識の消失、片腕や足・顔の筋肉がビクッと
する、めまいなどの症状があらわれることがあります。これらの
症状があらわれた場合は、すぐに受診してください。
- OD錠は水なしでも服用することができます。舌の上でだ液を
含ませて軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。
ただし、水なしの場合には寝たままで服用しないでください。

▶ 服用中の注意

- このお薬を服用すると、**眠気・集中力や
反射運動能力などの低下**がおこることが
あります。**自動車の運転など危険を伴う
機械の操作は行わないでください。**



- 汗の量が少なくなることがあります。
体温が上昇し、熱中症になることがあるので、**高温になる場所
を出来るだけ避けてください。**特に夏季に体温が上昇すること
があるので注意してください。
**発汗が少なくなったり、体温が上昇したり、顔が赤くなったり、
意識障害があらわれた場合には、すぐに受診してください。**

- このお薬の服用中または中止後に、**死にたいと考えるようにな**
ることがあります。このような気持ちになった場合には
医師に相談してください。
- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。
他の病院を受診する場合や、薬局で他のお薬を購入する場合
には、必ず**このお薬を服用していることを医師または薬剤師
に伝えてください。**

▶ 副作用について

- 次の症状に気づいたら、すぐに医師または薬剤師に連絡して
ください。



- この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないこと
がある場合には、医師または薬剤師に気軽に相談してください。

▶ 保管等に関する注意点

- 直射日光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管
してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲つ
たり渡したりしないでください。

ゾニサミドOD錠TRE「日医工」 を服用される方、ご家族・介護者の方へ

このお薬は、パーキンソン病の運動症状やレビー小体型認知症に伴うパーキンソニズムを改善します。

▶ 飲み方について

- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。
- 飲み忘れに気付いても、決して2回分を一度に服用しないでください。
多く服用したとき、意識の消失、片腕や足・顔の筋肉がビクッと
する、めまいなどの症状があらわれることがあります。これらの
症状があらわれた場合は、すぐに受診してください。
- OD錠は水なしでも服用することができます。舌の上でだ液を
含ませて軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。
ただし、水なしの場合には寝たままで服用しないでください。

▶ 服用中の注意

- このお薬を服用すると、**眠気・集中力や
反射運動能力などの低下**がおこることが
あります。**自動車の運転など危険を伴う
機械の操作は行わないでください。**



- 汗の量が少なくなることがあります。
体温が上昇し、熱中症になることがあるので、**高温になる場所
を出来るだけ避けてください。**特に夏季に体温が上昇すること
があるので注意してください。
**発汗が少なくなったり、体温が上昇したり、顔が赤くなったり、
意識障害があらわれた場合には、すぐに受診してください。**

- このお薬の服用中または中止後に、**死にたいと考えるようにな**
ることがあります。このような気持ちになった場合には
医師に相談してください。
- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。
他の病院を受診する場合や、薬局で他のお薬を購入する場合
には、必ず**このお薬を服用していることを医師または薬剤師
に伝えてください。**

▶ 副作用について

- 次の症状に気づいたら、すぐに医師または薬剤師に連絡して
ください。



- この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないこと
がある場合には、医師または薬剤師に気軽に相談してください。

▶ 保管等に関する注意点

- 直射日光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管
してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲つ
たり渡したりしないでください。