


# 日医工の ツロブテロールテープ を使用される方へ

このお薬は、**気管支を拡げることで、気管支喘息や気管支炎などの息苦しさをやわらげるお薬**です。

## このお薬を貼る場所

- 子供・大人関係なく**胸、背中、上腕**のいずれか1カ所の**平らな部位**に貼ってください。




## 貼る時の注意点

- **テープは1日1回、必ず貼りかえてください。**
- 同じ部位に続けて貼ると、かゆみやかぶれなどが生じることがありますので、**新しいテープに貼りかえる時には、別の部位に貼るようにしてください。**
- 傷口や湿疹のある部位や汗をかきやすい部位、クリーム・軟膏などを塗った部位には貼らないでください。
- テープをはがす可能性のある子供には、手の届かない部位に貼ってください。
- テープが少しはがれてしまった場合は、刺激の少ない絆創膏等ではがれないよう固定してください。
- テープを一度はがすと、再び貼り直すことはできません。
- わからないことやいつもと違うと感じた場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

## 保管等に関する注意点

- 薬を使用するまでは、袋を開けずに高温を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。

## ツロブテロールテープの貼り方




このテープは、胸・背中・上腕のいずれか1カ所に貼り、使用します。事前に貼る場所を乾いたタオル等でよく拭き、きれいにします。切り口表示に従って、2カ所の切り口を両方とも矢印方向に切り取り、中のテープを取り出します。0.5mg、1mg、2mgのテープがありますが、使用方法はいずれも同じです。




「ライナー」と表示された印刷面を上 に します。



テープを山折りにし、両方のライナーを半分ほどテープから浮かせてから、片方のライナーをはがします。この時、テープの接着面に指がふれないように注意してください。また、テープを左右に強くひっぱらないようにしてください。



残りのライナーを持って、ライナーをはがしたテープ部分を胸・背中・上腕のいずれか1カ所に貼り、軽く押さえます。残りのライナーをゆっくりはがしながらテープを貼っていきます。



貼ったあと、シワができないよう手のひらでテープ全体と四隅をまんべんなく押さえます。



日医工株式会社

NICHIKO