

テルビナフィン錠125mg「NIG」 を服用される方へ

このお薬は、真菌（カビの一種）による皮ふや爪の感染症を治療するお薬です。ぬり薬では治療が難しい場合に使います。

飲み方について

- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。
- 飲み忘れに気付いても、決して2回分を一度に服用しないでください。

服用中の注意点

- このお薬は、まれに肝臓や血液などの副作用があらわれる場合があります。早期に副作用を発見するために、**このお薬を飲み始めてから2ヵ月間は月に1回、その後も定期的に血液検査を行います。**
- このお薬を服用すると、**眠気やめまい・ふらつき**などがあらわれることがあります。**高い所での作業、自動車の運転など危険を伴う機械を操作する場合には注意してください。**
- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局で他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**

副作用について

次の症状に気づいたら、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。

● 風邪のような症状

からだがだるい・
発熱・のどの痛み



風邪のような症状

● 皮ふや眼の症状

発しん・かゆみ・皮ふが赤くなる
白目や皮ふが黄色くなる
あおあざができる



皮ふや眼の症状

● 筋肉痛や脱力感などの症状

筋肉の痛み・力が入らない・
尿が赤褐色になる



筋肉痛や脱力感
などの症状

● 胃腸の症状

食欲不振・吐き気



胃腸の症状

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

保管等に関する注意点

- 光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。

テルビナフィン錠125mg「NIG」 を服用される方へ

このお薬は、真菌（カビの一種）による皮ふや爪の感染症を治療するお薬です。ぬり薬では治療が難しい場合に使います。

飲み方について

- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。
- 飲み忘れに気付いても、決して2回分を一度に服用しないでください。

服用中の注意点

- このお薬は、まれに肝臓や血液などの副作用があらわれる場合があります。早期に副作用を発見するために、**このお薬を飲み始めてから2ヵ月間は月に1回、その後も定期的に血液検査を行います。**
- このお薬を服用すると、**眠気やめまい・ふらつき**などがあらわれることがあります。**高い所での作業、自動車の運転など危険を伴う機械を操作する場合には注意してください。**
- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局で他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**

副作用について

次の症状に気づいたら、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。

● 風邪のような症状

からだがだるい・
発熱・のどの痛み



風邪のような症状

● 皮ふや眼の症状

発しん・かゆみ・皮ふが赤くなる
白目や皮ふが黄色くなる
あおあざができる



皮ふや眼の症状

● 筋肉痛や脱力感などの症状

筋肉の痛み・力が入らない・
尿が赤褐色になる



筋肉痛や脱力感
などの症状

● 胃腸の症状

食欲不振・吐き気



胃腸の症状

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

保管等に関する注意点

- 光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。