

トアラセット配合錠「NIG」 を服用される方へ

このお薬は、トラマドールとアセトアミノフェンという
痛みをおさえる2つの有効成分を配合したお薬です。

服用する前に必ずお読みください

このお薬と同じ有効成分を含む他のお薬と一緒に服用しないでください。他の病院を受診する場合や、薬局でお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**特にアセトアミノフェンは市販の痛み止めやかぜ薬に含まれていることがありますので十分注意してください。

▶ 飲み方について

- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。自己判断でお薬をやめたり、服用量をかえたりしないでください。
- 1回2錠、1日8錠より多く服用しないでください。また、服用間隔は4時間以上空けてください。
- 空腹時の服用はできるだけ避けてください。
- 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。

▶ 服用中の注意点

- **飲酒は避けてください。**多量のアルコールによって副作用が出やすくなります。
- 眠気、めまい、意識消失が起こる可能性がありますので、**自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。**



▶ 副作用について

- このお薬を服用すると、吐き気、嘔吐、便秘、眠気、めまいなどが起こることがあります。症状が辛い場合やしばらくしてもおさまらない場合は、医師または薬剤師に相談してください。



この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

▶ 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。