

トアラセット配合錠「NIG」 を服用される方へ

このお薬は、トラマドールとアセトアミノフェンという
痛みをおさえる2つの有効成分を配合したお薬です。

服用する前に必ずお読みください

このお薬と同じ有効成分を含む他のお薬と一緒に服用しな
いでください。他の病院を受診する場合や、薬局でお薬を
購入する場合には、必ずこのお薬を服用していることを医師
または薬剤師に伝えてください。特にアセトアミノフェンは
市販の痛み止めやかぜ薬に含まれていることがあります
ので十分注意してください。

▶ 飲み方について

- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。自己判断
でお薬をやめたり、服用量をかえたりしないでください。
- 1回2錠、1日8錠より多く服用しないでください。また、服用
間隔は4時間以上空けてください。
- 空腹時の服用はできるだけ避けてください。
- 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないで
ください。

▶ 服用中の注意点

- **飲酒は避けてください。**多量のアルコールによって副作用が
出やすくなります。
- 眠気、めまい、意識消失が起こる可能性
がありますので、**自動車の運転など危険
を伴う機械の操作はしないでください。**



▶ 副作用について

- このお薬を服用すると、吐き気、嘔吐、便秘、眠気、めまいなど
が起こることがあります。症状が辛い場合やしばらくしても
おさまらない場合は、医師または薬剤師に相談してください。



この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことが
ある場合には、医師または薬剤師に気軽に相談してください。

▶ 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管
してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲った
り渡したりしないでください。

トアラセット配合錠「NIG」 を服用される方へ

このお薬は、トラマドールとアセトアミノフェンという
痛みをおさえる2つの有効成分を配合したお薬です。

服用する前に必ずお読みください

このお薬と同じ有効成分を含む他のお薬と一緒に服用しな
いでください。他の病院を受診する場合や、薬局でお薬を
購入する場合には、必ずこのお薬を服用していることを医師
または薬剤師に伝えてください。特にアセトアミノフェンは
市販の痛み止めやかぜ薬に含まれていることがあります
ので十分注意してください。

▶ 飲み方について

- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。自己判断
でお薬をやめたり、服用量をかえたりしないでください。
- 1回2錠、1日8錠より多く服用しないでください。また、服用
間隔は4時間以上空けてください。
- 空腹時の服用はできるだけ避けてください。
- 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないで
ください。

▶ 服用中の注意点

- **飲酒は避けてください。**多量のアルコールによって副作用が
出やすくなります。
- 眠気、めまい、意識消失が起こる可能性
がありますので、**自動車の運転など危険
を伴う機械の操作はしないでください。**



▶ 副作用について

- このお薬を服用すると、吐き気、嘔吐、便秘、眠気、めまいなど
が起こることがあります。症状が辛い場合やしばらくしても
おさまらない場合は、医師または薬剤師に相談してください。



この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことが
ある場合には、医師または薬剤師に気軽に相談してください。

▶ 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管
してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲った
り渡したりしないでください。