

**本資料の情報に関する注意**

本資料には試験方法等が確立していない内容も含まれており、あくまでも記載されている試験方法で得られた結果を事実として提示している。医療従事者が臨床適用を検討する上での参考情報であり、可否を示すものではない。

## 安定性試験 (無包装状態)

### トリクロルメチアジド錠 2mg 「NIG」

#### 無包装状態の安定性試験

トリクロルメチアジド錠 2mg 「NIG」の無包装状態における安定性を検討した結果、曝光下の保存条件において、性状は開始時淡赤色の片面 1/2 割線入り素錠であり、総曝光量 60 万 Lx・hr 照射後に退色した。40℃、25℃・75%RH の保存条件における各試験項目は全て規格内であった。

● 無包装 40℃ [遮光・気密容器]

(最小値～最大値)

試験項目 <規格>	ロット 番号	保存期間	
		開始時	3 ヶ月
性状 <淡赤色の片面 1/2 割線入りの 素錠>	344602	淡赤色の片面 1/2 割線入り 素錠	淡赤色の片面 1/2 割線入り 素錠
溶出性 (%) <15 分, 75%以上>	344602	82.0~90.2	85.3~88.1
残存率 (%)	344602	100	99.0
(参考値) 硬度 (kg)	344602	15.5	18.3

● 無包装 25℃・75%RH [遮光・開放]

(最小値～最大値)

試験項目 <規格>	ロット 番号	保存期間	
		開始時	3 ヶ月
性状 <淡赤色の片面 1/2 割線入りの 素錠>	344602	淡赤色の片面 1/2 割線入り 素錠	淡赤色の片面 1/2 割線入り 素錠
溶出性 (%) <15 分, 75%以上>	344602	82.0～90.2	90.7～95.1
残存率	344602	100	97.1
(参考値) 硬度 (kg)	344602	15.5	11.1

● 無包装 曝光量 60 万 Lx・hr [ビニール袋]

(最小値～最大値)

試験項目 <規格>	ロット 番号	総曝光量	
		開始時	60 万 Lx・hr
性状 <淡赤色の片面 1/2 割線入りの 素錠>	344602	淡赤色の片面 1/2 割線入り 素錠	淡赤色の退色
溶出性 (%) <15 分, 75%以上>	344602	82.0～90.2	80.5～86.3
残存率	344602	100	99.0
(参考値) 硬度 (kg)	344602	15.5	15.7