

日医工の ナフトピジル錠/OD錠 を服用される方へ

このお薬は、ぜんりつせん ひ だいしやう前立腺肥大症に伴うはいにようしやうがい排尿障害の改善に
使用されるお薬です。

▶ 飲み方について


- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。
- 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。
- OD錠は水なしでも服用することができます。舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。ただし、水なしの場合には寝たままで服用しないでください。

▶ 服用中の注意点

- 白内障などの手術を受ける場合には、このお薬を服用していることを眼科の医師に伝えてください。



- めまい、立ちくらみなどがあらわれる場合がありますので、**高い所での作業や自動車の運転など危険を伴う機械を操作する場合は十分注意してください。**



- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**

▶ 副作用について

- このお薬の服用で、めまいやふらつき、立ちくらみ、頭痛などがあらわれることがあります。症状が辛い場合には、医師または薬剤師に相談してください。



めまい・ふらつき



立ちくらみ



頭痛

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**主治医または薬剤師に気軽に相談してください。**

▶ 保管等に関する注意点

- 光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。光により変色することがあります。**変色したお薬は服用しないでください。**
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。

日医工の ナフトピジル錠/OD錠 を服用される方へ

このお薬は、ぜんりつせん ひ だいしやう前立腺肥大症に伴うはいにようしやうがい排尿障害の改善に
使用されるお薬です。

▶ 飲み方について


- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。
- 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。
- OD錠は水なしでも服用することができます。舌の上でだ液を含ませ軽くつぶしてから、だ液と一緒に飲み込んでください。ただし、水なしの場合には寝たままで服用しないでください。

▶ 服用中の注意点

- 白内障などの手術を受ける場合には、このお薬を服用していることを眼科の医師に伝えてください。



- めまい、立ちくらみなどがあらわれる場合がありますので、**高い所での作業や自動車の運転など危険を伴う機械を操作する場合は十分注意してください。**



- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**

▶ 副作用について

- このお薬の服用で、めまいやふらつき、立ちくらみ、頭痛などがあらわれることがあります。症状が辛い場合には、医師または薬剤師に相談してください。



めまい・ふらつき



立ちくらみ



頭痛

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**主治医または薬剤師に気軽に相談してください。**

▶ 保管等に関する注意点

- 光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。光により変色することがあります。**変色したお薬は服用しないでください。**
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。