

ピコスルファートNa内用液0.75%「NIG」を服用される方へ

このお薬は下剤です。目には入れないこと。

○このお薬は、1日1回寝る前にコップ半分くらいの水に滴下して服用してください。

1日1回 滴

○右の図のように容器の胴部分をゆっくりと押して、1滴ずつ滴下してください。



○医師・薬剤師に指示された滴数を服用してください。
ただし、便が硬過ぎたり軟らか過ぎる場合には、2滴ずつ（小児の場合は1滴ずつ）増減して、自分に適した量を服用してください。

○通常、基準の滴数は次の通りです。

用量	年齢	6か月以下	7~12か月	1~3才	4~6才	7~15才	成人
滴数		2	3	6	7	10	10~15

 **日医工株式会社**

2022年2月作成
N202200025

ピコスルファートNa内用液0.75%「NIG」を服用される方へ

このお薬は下剤です。目には入れないこと。

○このお薬は、1日1回寝る前にコップ半分くらいの水に滴下して服用してください。

1日1回 滴

○右の図のように容器の胴部分をゆっくりと押して、1滴ずつ滴下してください。



○医師・薬剤師に指示された滴数を服用してください。
ただし、便が硬過ぎたり軟らか過ぎる場合には、2滴ずつ（小児の場合は1滴ずつ）増減して、自分に適した量を服用してください。

○通常、基準の滴数は次の通りです。

用量	年齢	6か月以下	7~12か月	1~3才	4~6才	7~15才	成人
滴数		2	3	6	7	10	10~15

 **日医工株式会社**

2022年2月作成
N202200025

ピコスルファートNa内用液0.75%「NIG」を服用される方へ

このお薬は下剤です。目には入れないこと。

○このお薬は、1日1回寝る前にコップ半分くらいの水に滴下して服用してください。

1日1回 滴

○右の図のように容器の胴部分をゆっくりと押して、1滴ずつ滴下してください。



○医師・薬剤師に指示された滴数を服用してください。
ただし、便が硬過ぎたり軟らか過ぎる場合には、2滴ずつ（小児の場合は1滴ずつ）増減して、自分に適した量を服用してください。

○通常、基準の滴数は次の通りです。

用量	年齢	6か月以下	7~12か月	1~3才	4~6才	7~15才	成人
滴数		2	3	6	7	10	10~15

 **日医工株式会社**

2022年2月作成
N202200025

ピコスルファートNa内用液0.75%「NIG」を服用される方へ

このお薬は下剤です。目には入れないこと。

○このお薬は、1日1回寝る前にコップ半分くらいの水に滴下して服用してください。

1日1回 滴

○右の図のように容器の胴部分をゆっくりと押して、1滴ずつ滴下してください。



○医師・薬剤師に指示された滴数を服用してください。
ただし、便が硬過ぎたり軟らか過ぎる場合には、2滴ずつ（小児の場合は1滴ずつ）増減して、自分に適した量を服用してください。

○通常、基準の滴数は次の通りです。

用量	年齢	6か月以下	7~12か月	1~3才	4~6才	7~15才	成人
滴数		2	3	6	7	10	10~15

 **日医工株式会社**

2022年2月作成
N202200025

ピコスルファートNa内用液0.75%「NIG」を服用される方へ

このお薬は下剤です。目には入れないこと。

○このお薬は、1日1回寝る前にコップ半分くらいの水に滴下して服用してください。

1日1回 滴

○右の図のように容器の胴部分をゆっくりと押して、1滴ずつ滴下してください。



○医師・薬剤師に指示された滴数を服用してください。
ただし、便が硬過ぎたり軟らか過ぎる場合には、2滴ずつ（小児の場合は1滴ずつ）増減して、自分に適した量を服用してください。

○通常、基準の滴数は次の通りです。

用量	年齢	6か月以下	7~12か月	1~3才	4~6才	7~15才	成人
滴数		2	3	6	7	10	10~15

 **日医工株式会社**

2022年2月作成
N202200025

ピコスルファートNa内用液0.75%「NIG」を服用される方へ

このお薬は下剤です。目には入れないこと。

○このお薬は、1日1回寝る前にコップ半分くらいの水に滴下して服用してください。

1日1回 滴

○右の図のように容器の胴部分をゆっくりと押して、1滴ずつ滴下してください。



○医師・薬剤師に指示された滴数を服用してください。
ただし、便が硬過ぎたり軟らか過ぎる場合には、2滴ずつ（小児の場合は1滴ずつ）増減して、自分に適した量を服用してください。

○通常、基準の滴数は次の通りです。

用量	年齢	6か月以下	7~12か月	1~3才	4~6才	7~15才	成人
滴数		2	3	6	7	10	10~15

 **日医工株式会社**

2022年2月作成
N202200025

ピコスルファートNa内用液0.75%「NIG」を服用される方へ

このお薬は下剤です。目には入れないこと。

○このお薬は、1日1回寝る前にコップ半分くらいの水に滴下して服用してください。

1日1回 滴

○右の図のように容器の胴部分をゆっくりと押して、1滴ずつ滴下してください。



○医師・薬剤師に指示された滴数を服用してください。
ただし、便が硬過ぎたり軟らか過ぎる場合には、2滴ずつ（小児の場合は1滴ずつ）増減して、自分に適した量を服用してください。

○通常、基準の滴数は次の通りです。

用量	年齢	6か月以下	7~12か月	1~3才	4~6才	7~15才	成人
滴数		2	3	6	7	10	10~15

 **日医工株式会社**

2022年2月作成
N202200025

ピコスルファートNa内用液0.75%「NIG」を服用される方へ

このお薬は下剤です。目には入れないこと。

○このお薬は、1日1回寝る前にコップ半分くらいの水に滴下して服用してください。

1日1回 滴

○右の図のように容器の胴部分をゆっくりと押して、1滴ずつ滴下してください。



○医師・薬剤師に指示された滴数を服用してください。
ただし、便が硬過ぎたり軟らか過ぎる場合には、2滴ずつ（小児の場合は1滴ずつ）増減して、自分に適した量を服用してください。

○通常、基準の滴数は次の通りです。

用量	年齢	6か月以下	7~12か月	1~3才	4~6才	7~15才	成人
滴数		2	3	6	7	10	10~15

 **日医工株式会社**

2022年2月作成
N202200025

ピコスルファートNa内用液0.75%「NIG」を服用される方へ

このお薬は下剤です。目には入れないこと。

○このお薬は、1日1回寝る前にコップ半分くらいの水に滴下して服用してください。

1日1回 滴

○右の図のように容器の胴部分をゆっくりと押して、1滴ずつ滴下してください。



○医師・薬剤師に指示された滴数を服用してください。
ただし、便が硬過ぎたり軟らか過ぎる場合には、2滴ずつ（小児の場合は1滴ずつ）増減して、自分に適した量を服用してください。

○通常、基準の滴数は次の通りです。

用量	年齢	6か月以下	7~12か月	1~3才	4~6才	7~15才	成人
滴数		2	3	6	7	10	10~15

 **日医工株式会社**

2022年2月作成
N202200025

ピコスルファートNa内用液0.75%「NIG」を服用される方へ

このお薬は下剤です。目には入れないこと。

○このお薬は、1日1回寝る前にコップ半分くらいの水に滴下して服用してください。

1日1回 滴

○右の図のように容器の胴部分をゆっくりと押して、1滴ずつ滴下してください。



○医師・薬剤師に指示された滴数を服用してください。
ただし、便が硬過ぎたり軟らか過ぎる場合には、2滴ずつ（小児の場合は1滴ずつ）増減して、自分に適した量を服用してください。

○通常、基準の滴数は次の通りです。

用量	年齢	6か月以下	7~12か月	1~3才	4~6才	7~15才	成人
滴数		2	3	6	7	10	10~15

 **日医工株式会社**

2022年2月作成
N202200025

ピコスルファートNa内用液0.75%「NIG」を服用される方へ

このお薬は下剤です。目には入れないこと。

○このお薬は、1日1回寝る前にコップ半分くらいの水に滴下して服用してください。

1日1回 滴

○右の図のように容器の胴部分をゆっくりと押して、1滴ずつ滴下してください。



○医師・薬剤師に指示された滴数を服用してください。
ただし、便が硬過ぎたり軟らか過ぎる場合には、2滴ずつ（小児の場合は1滴ずつ）増減して、自分に適した量を服用してください。

○通常、基準の滴数は次の通りです。

用量	年齢	6か月以下	7~12か月	1~3才	4~6才	7~15才	成人
滴数		2	3	6	7	10	10~15

 **日医工株式会社**

2022年2月作成
N202200025

ピコスルファートNa内用液0.75%「NIG」を服用される方へ

このお薬は下剤です。目には入れないこと。

○このお薬は、1日1回寝る前にコップ半分くらいの水に滴下して服用してください。

1日1回 滴

○右の図のように容器の胴部分をゆっくりと押して、1滴ずつ滴下してください。



○医師・薬剤師に指示された滴数を服用してください。
ただし、便が硬過ぎたり軟らか過ぎる場合には、2滴ずつ（小児の場合は1滴ずつ）増減して、自分に適した量を服用してください。

○通常、基準の滴数は次の通りです。

用量	年齢	6か月以下	7~12か月	1~3才	4~6才	7~15才	成人
滴数		2	3	6	7	10	10~15

 **日医工株式会社**

2022年2月作成
N202200025