

# フィナステリド錠「NIG」を 服用されている方へ

このお薬は男性型脱毛症の進行を  
遅らせるお薬です



## 服用上の注意点

1日1回、6ヵ月継続して服用してください。

- 効果が確認できるまで通常6ヵ月の連日服用が必要です。
- 自己判断で服用を止めないようにしてください。
- 6ヵ月服用しても効果が認められない場合は、医師に相談してください。

男性成人のみ服用してください。

- 女性には効果が認められていません。妊娠中あるいは妊娠している可能性のある方及び授乳中の方は服用しないでください。  
(妊娠中の方が服用すると男子胎児の生殖器官等の正常発育に影響を及ぼすおそれがあります。)

## お薬の取り扱いについて

分割・粉砕して服用しないでください。

- 分割・粉砕した本剤に妊娠中の女性が接触すると、有効成分が吸収され、男子胎児の生殖器官等の正常発育に影響を及ぼすおそれがあります。  
錠剤を割って服用した場合の安全性・有効性は保証されておりません。なお、本剤はコーティングされていますので、割れたり砕けたりしない限り、通常の扱いにおいて有効成分に触れることはありません。

家族や他の人にあげないでください。

小児の誤飲に注意してください。

- 小児の手の届かないところに保管してください。誤飲の原因となりますので、他の容器に入れ替えないでください。



## この薬の副作用

- **肝機能障害のある方は医師に相談してください。**

この薬は肝臓で代謝される薬です。肝機能障害のある方は、服用前に医師に相談してください。また服用中に全身倦怠感などの肝機能障害の症状があらわれた場合はすぐに服用をやめて、医師の診断を受けてください。

## その他の注意

- **前立腺がんの検診を受ける予定のある方は、検査を実施される医師にフィナステリド錠「NIG」を服用していることをお知らせください。**  
この薬は、前立腺がん検査で測定されるPSA値を約50%低下させることが知られています。
- **この薬を服用中、および服用後1ヵ月間は献血をご遠慮ください。**

### 偽造医薬品にご注意ください。

偽造医薬品を服用した場合は思いがけない健康被害が発生する可能性があります。偽造医薬品を服用しないために、インターネットなどで安易に注文せず、医療機関を受診して、医師の処方により正しく服用してください。

### 厚生労働省：個人輸入に関する注意

「医薬品などを海外から輸入しようとする方へ」

[http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/iyakuhin/kojinyunyu/](http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/iyakuhin/kojinyunyu/)

個人輸入された医薬品による健康被害については公的制度（医薬品副作用被害救済制度）の救済対象となりません。