

日医工の プラバスタチンナトリウム錠 を服用される方へ

このお薬は、コレステロールの合成を抑えることで、
血液中のコレステロールを減らすお薬です。

▶ 飲み方について

- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。
- 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。

▶ 服用中の注意点

- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。



▶ 副作用について

- このお薬の副作用として、ごくまれに「横紋筋融解症」*という筋肉の障害があらわれることがあります。次の症状に気づいたら、**直ちに服用をやめて、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。**



筋肉の痛み・こわばり、筋力の低下、手足のしびれ、赤褐色の尿

副作用はどんなお薬でもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば大事に至ることはほとんどありません。また、この他にも気になる症状があらわれた場合や、わからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

*「横紋筋融解症」とは
筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋肉の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる)になることもあります。

▶ 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。

日医工の プラバスタチンナトリウム錠 を服用される方へ

このお薬は、コレステロールの合成を抑えることで、
血液中のコレステロールを減らすお薬です。

▶ 飲み方について

- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。
- 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。

▶ 服用中の注意点

- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。



▶ 副作用について

- このお薬の副作用として、ごくまれに「横紋筋融解症」*という筋肉の障害があらわれることがあります。次の症状に気づいたら、**直ちに服用をやめて、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。**



筋肉の痛み・こわばり、筋力の低下、手足のしびれ、赤褐色の尿

副作用はどんなお薬でもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば大事に至ることはほとんどありません。また、この他にも気になる症状があらわれた場合や、わからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

*「横紋筋融解症」とは
筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋肉の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる)になることもあります。

▶ 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。