

日医工の ベンズブロマロン錠 を服用される方へ

このお薬は、尿酸を尿中に排泄させて
高尿酸血症・痛風を治療するお薬です。

服用する前に必ずお読みください

患者さんによっては、このお薬を服用中に**肝臓の働きが低下することがあります**。それは**主に飲み始めてから6カ月以内**に多く認められています。

次の症状に気づいたら、**すぐに服用をやめて受診してください**。

食欲が
なくなる



吐き気
嘔吐



体が
だるい



腹痛




下痢



発熱



尿の色が濃く
(褐色に)なる



白目や皮膚が
黄色くなる



体のかゆみ、
発疹



▶ 飲み方について

- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。
- 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。

▶ 服用中の注意点

- このお薬の服用中は定期的に肝臓の検査がありますので**定期的に受診**してください。
- このお薬の飲み始めに、**痛風発作**が起こることがあります。他にも気になる症状があらわれた場合や、わからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談**してください。
- 水分を十分に摂るようにしてください。
- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えて**ください。



▶ 保管等に関する注意点

- 光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。

