

ベンズブロマロン錠「NIG」 を服用される方へ 必ずお読みください

このお薬は、血液中の尿酸を尿中に排泄させて
高尿酸血症・通風を治療するお薬です。

患者さんによっては、このお薬の服用中に肝臓の働きが
低下することがあり、主に飲み始めてから6ヵ月以内に
多く認められています。

お薬の服用中は定期的に肝機能検査を受けましょう。

肝臓の働きが低下したときによくみられる症状

- 食欲がなくなる
- 体がだるくなったと感じる（倦怠感）
- 尿の色が濃く（褐色）なる
- 皮膚や白目が黄色くなる（黄疸）
- 吐き気や下痢、発熱
- 体がかゆくなる
- 発疹がでる

このような症状に気づいたときは、服用を中止し、
すぐに医師または薬剤師に相談してください。



日医工 株式会社

2026年6月作成
N202600085

ベンズブロマロン錠「NIG」 を服用される方へ 必ずお読みください

このお薬は、血液中の尿酸を尿中に排泄させて
高尿酸血症・通風を治療するお薬です。

患者さんによっては、このお薬の服用中に肝臓の働きが
低下することがあり、主に飲み始めてから6ヵ月以内に
多く認められています。

お薬の服用中は定期的に肝機能検査を受けましょう。

肝臓の働きが低下したときによくみられる症状

- 食欲がなくなる
- 体がだるくなったと感じる（倦怠感）
- 尿の色が濃く（褐色）なる
- 皮膚や白目が黄色くなる（黄疸）
- 吐き気や下痢、発熱
- 体がかゆくなる
- 発疹がでる

このような症状に気づいたときは、服用を中止し、
すぐに医師または薬剤師に相談してください。



日医工 株式会社

2026年6月作成
N202600085

ベンズブロマロン錠「NIG」 を服用される方へ 必ずお読みください

このお薬は、血液中の尿酸を尿中に排泄させて
高尿酸血症・通風を治療するお薬です。

患者さんによっては、このお薬の服用中に肝臓の働きが
低下することがあり、主に飲み始めてから6ヵ月以内に
多く認められています。

お薬の服用中は定期的に肝機能検査を受けましょう。

肝臓の働きが低下したときによくみられる症状

- 食欲がなくなる
- 体がだるくなったと感じる（倦怠感）
- 尿の色が濃く（褐色）なる
- 皮膚や白目が黄色くなる（黄疸）
- 吐き気や下痢、発熱
- 体がかゆくなる
- 発疹がでる

このような症状に気づいたときは、服用を中止し、
すぐに医師または薬剤師に相談してください。



日医工 株式会社

2026年6月作成
N202600085

ベンズブロマロン錠「NIG」 を服用される方へ 必ずお読みください

このお薬は、血液中の尿酸を尿中に排泄させて
高尿酸血症・通風を治療するお薬です。

患者さんによっては、このお薬の服用中に肝臓の働きが
低下することがあり、主に飲み始めてから6ヵ月以内に
多く認められています。

お薬の服用中は定期的に肝機能検査を受けましょう。

肝臓の働きが低下したときによくみられる症状

- 食欲がなくなる
- 体がだるくなったと感じる（倦怠感）
- 尿の色が濃く（褐色）なる
- 皮膚や白目が黄色くなる（黄疸）
- 吐き気や下痢、発熱
- 体がかゆくなる
- 発疹がでる

このような症状に気づいたときは、服用を中止し、
すぐに医師または薬剤師に相談してください。



日医工 株式会社

2026年6月作成
N202600085