

ベンズブロマロン錠「NIG」 を服用される方へ

このお薬は、尿酸を尿中に排泄させて
高尿酸血症・痛風を治療するお薬です。

服用する前に必ずお読みください

患者さんによっては、このお薬を服用中に**肝臓の働きが低下することがあります**。それは**主に飲み始めてから6カ月以内**に多く認められています。

次の症状に気づいたら、**すぐに服用をやめて受診してください**。

食欲が
なくなる



吐き気
嘔吐



体が
だるい



腹痛




下痢



発熱



尿の色が濃く
(褐色に)なる



白目や皮膚が
黄色くなる



体のかゆみ、
発疹



▶ 飲み方について

- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。
- 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。

▶ 服用中の注意点

- このお薬の服用中は定期的に肝臓の検査がありますので**定期的に受診してください**。
- このお薬の飲み始めに、痛風発作が起こることがあります。他にも気になる症状があらわれた場合や、わからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください**。
- 水分を十分に摂るようにしてください。
- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください**。



▶ 保管等に関する注意点

- 光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。



ベンズブロマロン錠「NIG」 を服用される方へ

このお薬は、尿酸を尿中に排泄させて
高尿酸血症・痛風を治療するお薬です。

服用する前に必ずお読みください

患者さんによっては、このお薬を服用中に**肝臓の働きが低下することがあります**。それは**主に飲み始めてから6カ月以内**に多く認められています。

次の症状に気づいたら、**すぐに服用をやめて受診してください**。

食欲が
なくなる



吐き気
嘔吐



体が
だるい



腹痛




下痢



発熱



尿の色が濃く
(褐色に)なる



白目や皮膚が
黄色くなる



体のかゆみ、
発疹



▶ 飲み方について

- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。
- 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。

▶ 服用中の注意点

- このお薬の服用中は定期的に肝臓の検査がありますので**定期的に受診してください**。
- このお薬の飲み始めに、痛風発作が起こることがあります。他にも気になる症状があらわれた場合や、わからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください**。
- 水分を十分に摂るようにしてください。
- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください**。



▶ 保管等に関する注意点

- 光と高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。

