

ボリコナゾール錠「NIG」 を服用される方へ

このお薬は真菌感染症を治療するお薬です。

▶飲み方について

- このお薬は食事の影響を受けやすいので、**食間(食事と食事の間、食事の約2時間後が目安)**に服用してください。
- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。自己判断でお薬をやめたり、服用量をかえたりしないでください。
- 飲み忘れに気づいても、決して**2回分を一度に服用しないでください。**



▶副作用について

- このお薬の服用中に次のような症状があらわれた場合は、**すぐに医師または薬剤師に連絡してください。**

眼の症状

- まぶしく感じる(羞明)
しゅうめい
- ものが見えにくい(視覚異常)
- 目がかすむ(霧視)
むし
- 色の見え方が普段と異なる
(色覚異常)

皮膚の症状

- 日光にあたった部分が赤くなる(光線過敏性反応)

全身の症状

- 冷や汗、血の気が引く、息苦しい
- 高熱が出る、皮膚に赤い斑点、口内がただれる
- 体がだるい、食欲がない
- 胸の痛み、動悸
- 呼吸困難、全身のむくみ

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

▶服用中の注意点

- このお薬の服用に際し、定期的に血液検査などが行われることがあります。**医師の指示通りに通院してください。**
- 服用中止後も眼の症状(羞明、視覚異常、霧視など)が続くことがあります。これらの症状が回復するまでは、**自動車の運転などの危険を伴う機械の操作はしないでください。**
- お薬の服用中は、**長袖の衣類、帽子などを着用し、効果の高い日焼け止めや日傘などを使用して紫外線から皮膚を守ってください。**
- セイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)を含む食品は避けてください。このお薬に影響します。
- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**



▶保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。