

ホリナート錠「NIG」 を服用される方へ

このお薬は、テガフル・ウラシル配合剤（お薬名：ユーエフティ）というお薬の効果を高める働きがあります。

服用前に確認すること

現在、服用（使用）しているお薬や他のお薬を併用する場合には担当の医師や薬剤師に必ず相談してください。

一緒に飲んではいけないお薬

● **テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤**
（お薬名：ティーエスワン、○○エスワン、エスワン△△、エスエーワン）

過去7日以内にテガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤を服用していた場合も、このお薬による治療を始めないでください。

飲み合わせに注意が必要なお薬


下記のお薬を服用している場合は、医師・薬剤師に相談してください。

- **フェニトイン**（てんかんの薬）
- **ワルファリンカリウム**（血液を固まりにくくする薬）
- **トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤**（抗がん薬）
- **スルファメトキサゾール・トリメトプリムなど**（感染症の薬）

お薬の飲み方


- 1回1錠を1日3回(約8時間ごと)、テガフル・ウラシル配合剤(お薬名: ユーエフティ)と一緒に服用してください。
- お薬の吸収が悪くなりますので、**食事の前後1時間は服用しないでください。**

<服用時間の例>



治療スケジュール

- 28日間お薬の服用を続け、7日間服用をお休みします。これを1クールとして、繰り返します。



※医師の指示によってスケジュールが変更されることがあります。

- 自己判断でお薬の量や服用する時間・回数・期間を変更しないでください。

服用中の注意点

飲み忘れた場合

飲み忘れた分は飲まずに、次の服用時間に1回分服用してください。

絶対に2回分を一度に飲まないでください。



誤って多く飲んだ場合

すぐに医師または薬剤師に相談してください。



ほかの診療科や医療機関を受診する場合

このお薬を服用していることを医師・薬剤師に伝えてください。



医師の指示通りに通院

効果の確認や血液検査などで副作用の確認をしますので、医師の指示通りに通院してください。




服用中に注意が必要な症状(副作用)

下記のような症状があらわれたら、**お薬の服用をやめて、すぐに医師・薬剤師に連絡してください。**

腹痛・下痢



口内炎



風邪の症状



発熱、せき、のどの痛みなど

発疹・かゆみ



皮膚や目が黄色くなる



尿・便の変化



排尿時の痛み、赤褐色の尿、
血尿・血便など

あざ・出血



あざ、鼻血、歯ぐきからの
出血など

めまい・立ちくらみ



だるさ・食欲不振



上記以外でも、気になる症状がある場合は
必ず担当の医師・薬剤師に連絡してください。



日医工 株式会社

NICHI-IKO