

副作用について

- このお薬の服用でウトウトする、頭痛、気持ちが悪い、オシッコが近い、体がだるいなどの症状があらわれることがあります。症状が強い場合は、主治医または薬剤師に相談してください。



頭痛



気持ちが悪い



体がだるい

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- 包装された状態で保管してください。なるべく服用直前に包装から取り出すようにしてください。
- 包装が破損しないように保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。
- お薬の保管方法についてわからないことや不安なことがある場合には、**薬剤師に相談してください。**

デパケン[®]錠／R錠 デパケン[®]シロップ／細粒 を服用される方とご家族の方へ

このお薬はてんかんや躁状態そうじょうたいの治療に用いられます。
また、片頭痛発作の発症抑制にも用いられます。

服用する前に必ずお読みください

- このお薬には催奇形性さいきけいせい(胎児に奇形が生じる可能性)があるので、妊娠または妊娠している可能性のある方、妊娠する可能性のある方は、**必ず主治医に相談してください。**

【片頭痛発作の発症抑制で服用される方へ】
このお薬はすでに起こっている片頭痛の発作や症状を速やかに鎮めるお薬ではありません。毎日規則正しく服用することで発作の発症を抑制するお薬です。

● 飲み方について

- **必ず主治医または薬剤師の指示通りに服用してください。**自己判断で服用を中止したり、お薬の量を減らしたり増やしたりしないでください。
- 飲み忘れに気づいても、決して**2回分を一度に服用しないでください。**
- デパケン®R錠は、噛んだり、砕いたりせずそのまま水で服用してください。
- 旅行や外出するときには必要な量を忘れず携行してください。
- 誤って多く服用した場合は、主治医または薬剤師に連絡してください。
- お薬の飲み方についてわからなかったり、不安な場合には主治医または薬剤師に相談してください。



● 服用中の注意点

- 眠気、注意力・集中力・反射運動能力などが低下することがあります。

注意

<てんかんの治療で服用される方へ>
自動車の運転など危険を伴う機械の操作を希望する場合は、必ず医師に相談し許可を得てください。



<躁状態の治療、片頭痛発作の発症抑制のために服用される方へ>

自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。

- 妊娠したことに気づいたときには必ず、主治医に伝えてください。このお薬は胎児に影響を与えるおそれがあります。
- 授乳中の方は、このお薬の服用について主治医または薬剤師に相談してください。
- このお薬には一緒に服用してはいけないお薬や注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**

