

硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 を使用される方へ

このお薬は、皮膚に貼ることで効果を示す心臓病のお薬です。


使用する前に必ずお読みください

- このお薬の使用及び使用後は**以下のお薬を絶対に服用しないでください。**

- ・シルデナフィルクエン酸塩(バイアグラ錠、レバチオ錠など)
- ・バルデナフィル塩酸塩水和物(レビトラ錠など)
- ・タダラフィル(シアリス錠、アドシルカ錠、ザルティア錠など)
- ・リオシグアト(アデムパス錠など)

▶このお薬を貼る場所

- 胸部、上腹部または背部の  部分に貼ってください。
自動体外式除細動器(AED)の妨げにならない場所に貼ってください。




▶貼る時の注意点

- タオルなどで貼る場所の水分や汗をよく拭きとってから貼ってください。
- 傷口、発赤、発疹、かぶれ等のある場所には貼らないでください。
- 貼りかえるときは場所をかえて貼ってください。

▶このお薬の貼り方

下図の手順にしたがって貼ってください。


- 1 白色のフィルムの片方を半分くらいまではがして、半透明のテープの粘着面を身体に貼り付けてからフィルムをはがすと上手く貼れます。



- 2 もう片方のフィルムはテープを皮膚に貼りながらはがしてください。



- 3 テープがしわにならないよう注意して貼ってください。最後に、テープ全体を手のひらでよく押さえてしっかりと貼ってください。



▶副作用について

- 頭痛や血圧低下など、いつもと違う症状があらわれた場合や、わからないことがある場合には、**主治医又は薬剤師に気軽に相談してください。**

▶保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- アルミ袋開封後は早めにご使用ください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。

硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 を使用される方へ

このお薬は、皮膚に貼ることで効果を示す心臓病のお薬です。


使用する前に必ずお読みください

- このお薬の使用及び使用後は**以下のお薬を絶対に服用しないでください。**

- ・シルデナフィルクエン酸塩(バイアグラ錠、レバチオ錠など)
- ・バルデナフィル塩酸塩水和物(レビトラ錠など)
- ・タダラフィル(シアリス錠、アドシルカ錠、ザルティア錠など)
- ・リオシグアト(アデムパス錠など)

▶このお薬を貼る場所

- 胸部、上腹部または背部の  部分に貼ってください。
自動体外式除細動器(AED)の妨げにならない場所に貼ってください。




▶貼る時の注意点

- タオルなどで貼る場所の水分や汗をよく拭きとってから貼ってください。
- 傷口、発赤、発疹、かぶれ等のある場所には貼らないでください。
- 貼りかえるときは場所をかえて貼ってください。

▶このお薬の貼り方

下図の手順にしたがって貼ってください。


- 1 白色のフィルムの片方を半分くらいまではがして、半透明のテープの粘着面を身体に貼り付けてからフィルムをはがすと上手く貼れます。



- 2 もう片方のフィルムはテープを皮膚に貼りながらはがしてください。



- 3 テープがしわにならないよう注意して貼ってください。最後に、テープ全体を手のひらでよく押さえてしっかりと貼ってください。



▶副作用について

- 頭痛や血圧低下など、いつもと違う症状があらわれた場合や、わからないことがある場合には、主治医又は薬剤師に気軽に相談してください。

▶保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- アルミ袋開封後は早めにご使用ください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。