

## 溶出試験

アルツハイマー型・レビー小体型認知症治療剤  
**ドネペジル塩酸塩 OD フィルム 5mg 「EE」**  
 1 枚中ドネペジル塩酸塩 5 mg

### 溶出試験条件

装置	日本薬局方 溶出試験法 パドル法	液量	900mL	温度	37±0.5℃
----	------------------	----	-------	----	---------

### 溶出試験結果

回転数	試験液	判定
50rpm	pH1.2	標準製剤及び本品はともに15分以内に平均85%以上溶出した。
	pH5.0	標準製剤及び本品はともに15分以内に平均85%以上溶出した。
	pH6.8	標準製剤及び本品はともに15分以内に平均85%以上溶出した。
	水	標準製剤が360分における平均溶出率の1/2の平均溶出率を示す時点及び360分において、本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±12%の範囲になかった。
100rpm	pH6.8	標準製剤及び本品はともに15分以内に平均85%以上溶出した。

ドネペジル塩酸塩ODフィルム5mg「EE」の溶出挙動を標準製剤(口腔内崩壊錠, 5mg)と比較した結果, pH1.2, pH5.0, pH6.8(50rpm)およびpH6.8(100rpm)の試験液において「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」の判定基準に適合した。

