

日医工の バラシクロビル錠 を服用される方へ

このお薬は、単純ヘルペスウイルスや水痘・帯状疱疹ウイルスの増殖を抑えるお薬です。

■ 飲み方について

- 医師または薬剤師の指示通りに服用してください。自己判断でお薬をやめたり、服用量をかえたりしないでください。
- 飲み忘れに気づいても、決して2回分を一度に服用しないでください。

■ 服用中の注意点

- **このお薬の服用中は普段より多めに水分をとるように心がけてください。**脱水状態になると副作用が起きやすくなります。ただし、**水分を制限されている場合は医師の指示に従ってください。**
- 指示どおりに飲み続けても**症状が改善しなかったり悪化したりした場合は、できるだけ早く受診してください。**
- 意識障害（気を失う、もうろう状態）などがあらわれることがあるので、**自動車の運転などの危険を伴う機械の操作を行う場合は、十分注意してください。**



尚、腎臓に障害のある方は特に意識障害があらわれやすいので、状態によっては医師が自動車の運転などをしないように判断する場合があります。

- このお薬には一緒に服用する時に注意が必要なお薬があります。他の病院を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合には、**必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。**

■ 副作用について

- 次の症状に気づいたら、**服用を中止し、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。**



● めまい



● 意識の低下



● 尿がでない、尿量が減る



● 筋肉のつっぱりやけいれん

この他にも気になる症状があらわれた場合やわからないことがある場合には、**医師または薬剤師に気軽に相談してください。**

■ 保管等に関する注意点

- 直射日光・高温多湿を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- このお薬はあなただけに処方されたお薬です。他の人に譲ったり渡したりしないでください。



日医工株式会社

NICHI-IKO