

使用上の注意改訂のお知らせ

2005年11月

指定医薬品

処方せん医薬品：注意 - 医師等の処方せんにより使用すること

抗てんかん剤、躁病・躁状態治療剤

バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」

Sodium Valproate fine granules 20%「EMEC」

バルプロ酸ナトリウム細粒

製造販売元



サンノーバ株式会社
群馬県太田市世良田町3038-2

販売元



エルメッド エーザイ株式会社
東京都豊島区東池袋3 23 5

このたび、標記製品の「使用上の注意」を以下のとおり改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。

今後の弊社製品のご使用に際しましては、本書を適正使用情報としてご活用いただきますようお願い申し上げます。

最終頁に改訂後の添付文書全文を掲載しておりますので、併せてご参照ください。

〔改訂箇所及び改訂理由（項目別）〕

1 禁忌

改訂部分抜粋

下線部分を改訂いたしました。

改訂後	改訂前
<p>【禁忌】(次の患者には投与しないこと)</p> <p>2 本剤投与中はカルバペネム系抗生物質（パニペネム・ベタミプロン、メロペネム、イミペネム・シラスタチン、ピアペネム、<u>ドリペネム水和物</u>）を併用しないこと。 〔「相互作用」の項参照〕</p>	<p>【禁忌】(次の患者には投与しないこと)</p> <p>2 本剤投与中はカルバペネム系抗生物質（パニペネム・ベタミプロン、メロペネム、イミペネム・シラスタチン、ピアペネム）を併用しないこと。 〔「相互作用」の項参照〕</p>

改訂理由

自主改訂により、「禁忌」の項を変更いたしました。

2 相互作用（併用禁忌）

改訂部分抜粋

下線部分を改訂いたしました。

改 訂 後			改 訂 前		
3 相互作用 (1)併用禁忌（併用しないこと）			3 相互作用 (1)併用禁忌（併用しないこと）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カルバペネム系抗生物質 バニベネム・ベタミブロン（カルベニン）、メロベネム（メロペン）、イミベネム・シラスタチン（チエナム）、ピアベネム（オメガシン）、ドリベネム水和物（フイニボックス）	てんかんの発作が再発することがある。	バルプロ酸の血中濃度が低下する。	カルバペネム系抗生物質 バニベネム・ベタミブロン（カルベニン）、メロベネム（メロペン）、イミベネム・シラスタチン（チエナム）、ピアベネム（オメガシン）	てんかんの発作が再発することがある。	バルプロ酸の血中濃度が低下する。

改訂理由

自主改訂により、「相互作用」の「併用禁忌」の項を変更いたしました。